

## BRACHIOPODA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<b>Subphylum Craniiformea</b>												
<b>Classe Craniata</b>												
<b>Ordine Craniida</b>												
Superfamiglia <b>Cranoidea</b>												
Famiglia <b>Craniidae</b>												
<i>Novocrania</i>	Lee & Brunton, 1986											
<i>Novocrania anomala</i>	(Müller, 1776)	x	x	x		x	x		x		a1	
<i>Novocrania turbinata</i>	(Poli, 1795)					x			x		a1	
<b>Subphylum Rhynchonelliformea</b>												
<b>Classe Rhynchonellata</b>												
<b>Ordine Rhynchonellida</b>												
Superfamiglia <b>Norelloidea</b>												
Famiglia <b>Tethyrhynchiidae</b>												
<i>Tethyrhynchia</i>	Logan & Zibrowius, 1994											
<i>Tethyrhynchia mediterranea</i>	Logan & Zibrowius, 1994								x			A1
<b>Ordine Thecideida</b>												
Superfamiglia <b>Thecideoidea</b>												
Famiglia <b>Thecideidae</b>												
Sottofamiglia <b>Lacazellinae</b>												
<i>Lacazella</i>	Munier-Chalmas, 1881											
<i>Lacazella mediterranea</i>	(Risso, 1826)			x		x						
<b>Ordine Terebratulida</b>												
<b>Sottordine Terebratulidina</b>												
Superfamiglia <b>Terebratuloidea</b>												
Famiglia <b>Terebratulidae</b>												
Sottofamiglia <b>Gryphinae</b>												
<i>Gryphus</i>	Megerle von Mühlfeld, 1811											
<i>Gryphus vitreus</i>	(Born, 1778)	x	x	x		x			x			
Superfamiglia <b>Cancellothyroidea</b>												
Famiglia <b>Cancellothyrididae</b>												
Sottofamiglia <b>Cancellothyridinae</b>												
<i>Terebratulina</i>	d'Orbigny, 1847											
<i>Terebratulina retusa</i>	(Linnaeus, 1758)	x	x	x		x						
<b>Sottordine Terebratellidina</b>												
Superfamiglia <b>Laqueoidea</b>												
Famiglia <b>Frenulinidae</b>												
Sottofamiglia <b>Frenulininae</b>												
<i>Frenulina</i>	Dall, 1894											
<i>Frenulina sanguinolenta</i>	(Gmelin, 1790)							x				A2
Superfamiglia <b>Megathyridoidea</b>												
Famiglia <b>Megathyrididae</b>												
<i>Megathiris</i>	d'Orbigny, 1847											
<i>Megathiris detruncata</i>	(Gmelin, 1790)	x	x	x		x	x	x	x	x		
<i>Argyrotheca</i>	Dall, 1900											
<i>Argyrotheca cistellula</i>	(Searles-Wood, 1841)	x	x				x	x	x	x		
<i>Argyrotheca cordata</i>	(Risso, 1826)	x	x	x		x	x	x	x			
<i>Argyrotheca cuneata</i>	(Risso, 1826)	x	x	x		x	x	x	x	x		
Superfamiglia <b>Platidoidea</b>												
Famiglia <b>Platidiidae</b>												
Sottofamiglia <b>Platidiinae</b>												
<i>Platidia</i>	O.G. Costa, 1852											
<i>Platidia animioides</i>	(Scacchi & Philippi, 1844)	x	x									
<i>Platidia davidsoni</i>	(Eudes-Deslongchamps, 1855)	x	x									
Superfamiglia <b>Kraussinoidea</b>												
Famiglia <b>Kraussinidae</b>												
<i>Megerlia</i>	King, 1850											
<i>Megerlia truncata</i>	(Linnaeus, 1767)	x	x	x		x	x	x	x	x	a2	
<b>Sottordine incerto</b>												
Superfamiglia <b>Gwynioidea</b>												
<i>Gwynia</i>	King, 1859											
<i>Gwynia capsula</i>	(Jeffreys, 1859)								x			A3

## SINONIMIE

a1: Il genere *Novocrania* è stato creato per le specie attuali del genere *Crania* che, dunque, comprende solo le specie fossili.

a2: *Megerlia echinata*; = *M. monstrosa*; = *M. gigantea*; = *Pantellaria monstrosa* (pubblicazione in preparazione).

## BIBLIOGRAFIA

A1: nuovo genere e nuova specie da Logan *et al.* 2000.

A2: la specie è stata segnalata per prima volta in acque mediterranee da Taddei Ruggiero 2000.

A3: segnalata per prima volta in acque mediterranee da Simon & Willems 1999.

## NOTA

Sistematica aggiornata secondo Emig (23/08/2006)