ANNALES DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE NICE
Tome V, 1977, pp. 101-150.

RÉVISION DES TAXA MALACOLOGIQUES MÉDITERRANÉENS INTRODUITS PAR ANTOINE RISSO

PATRICK M. ARNAUD
Station Marine d'Endoume, 13007 Marseille

RESUME

La seule collection malacologique connue du célèbre naturaliste Antoine Risso, ainsi que ses manuscrits, sont conservés depuis 1927 au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Le premier problème a consisté à établir la liste exacte des nouveaux taxa malacologiques publiés par A. Risso de 1813 à 1854 : il a en effet présenté comme étant de lui plusieurs taxa introduits par d'autres. Finalement, 515 noms spécifiques et 57 noms génériques sont considérés comme réellement introduits par Risso parmi tous les groupes de mollusques marins et non marins, actuels ou fossiles, de la région de Nice (Alpes-Maritimes).

L'examen de tout le matériel disponible révèle que 185 de ces taxa spécifiques seulement sont représentés dans la collection Risso du Muséum par du matériel type, ou par une étiquette originale accompagnée de matériel sans rapport, ou isolée. Tous les taxa spécifiques et génériques de Risso sont cités alphabétiquement, commentés et réévalués, avec désignations de 110 lectotypes. Ce travail est illustré par plus de 250 reproductions de figures inédites des espèces nouvelles de Risso peintes d'après nature par P. Gény il y a environ 130 ans.

SUMMARY

The only known malacological collection of the famous naturalist Antoine Risso, as well as his manuscripts, are located in the Muséum national d'Histoire naturelle in Paris, since 1927. The first problem was to establish the check-list of the new malacological taxa published from 1813 to 1854 by A. Risso, since he has frequently quoted as new ones species already described by other naturalists. As a result, 515 specific and 57 generic names are credited to A. Risso, concerning every groups of marine and non-marine mollusks, living and fossil from the region of Nice (mostly Alpes-Maritimes).

A survey of all available material shows that 185 of these specific taxa are present in his collection either by type material, or by original hand-writen labels associated with irrelevant material, or loose. All the Risso's specific and generic taxa are listed alphabetically with comments and reevaluation, including designations of 110 lectotypes. The paper is illustrated by more than 250 unpublished figures of the new species of Risso, painted about 130 years ago by P. Gény.

L'œuvre malacologique d'Antoine Risso (1777-1845) est considérable (1). Son travail le plus important et le plus connu sur les mollusques est évidemment le volume 4 de son ouvrage « Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale... » (1826), mais on lui doit aussi plusieurs articles (1813, 1818, 1824, 1831, 1841 et 1845) et un ouvrage posthume peu connu sur les Céphalopodes de Méditerranée (1854).

RISSO MALACOLOGISTE ET LA CRITIQUE

Malheureusement, cette œuvre qui a été beaucoup consultée a souvent déçu et rebuté par ses faiblesses autant que par la pauvreté de son iconographie (mis à part le volume de 1854) : elle a généralement été jugée très sévèrement. Je n'en donnerai que quatre exemples.

(1) On trouvera des études générales sur sa vie et son œuvre dans le présent volume.

Risso eut avec J.B. Vérany plusieurs différends scientifiques au sujet des Céphalopodes, et celui-ci dans une analyse en forme de pamphlet (1845) publiée à la suite de sa liste de Céphalopodes, lui a décoché diverses flèches et termine par cette sentence résumant son intervention : « mais avant tout que M. Risso sur cette branche de l'histoire naturelle se mette au courrant *(sic)* de la science ». Ce qui, somme toute, n'est pas si méchant de la part d'un homme que Risso avait formellement accusé (1845) d'avoir fabriqué une espèce nouvelle, *Octopus carena,* en coupant les nageoires et les bras de sa *Sepia italica !*

Une critique comme celle de Cantraine (1840) paraît cependant presque anodine par comparaison : à propos de *Doris testudinaria* Risso cité par Delle Chiaje, il écrit : « Serait-ce aussi celle de Risso ? Je l'ignore, tant il est difficile de deviner les espèces que le naturaliste de Nice décrit ».

Bourguignat (1861) a usé quant à lui d'un langage encore plus crû quoique plus fleuri dont un long extrait s'impose ici pour montrer que la critique de Risso a pu être poussée jusqu'à la haine, même après

sa mort : « La malacologie (...) a eu ses homme de génie, ses savants consciencieux et infatigables; de même qu'elle a eu ses ignorants et ses charlatans. — Eclaircie, développée, illustrée par les uns, elle a été perdue, avilie par les autres. Il en est surtout, parmi ces derniers, dont les noms seuls ont le triste privilège d'exciter une sainte indignation. Par une malheureuse fatalité, ces hommes sont généralement ceux qui ont le plus produit, ceux dont les travaux, publiés à un grand nombre d'exemplaires, sont les plus répandus.

« Ces ouvrages, *Rudis indigestaque moles* de familles, de genres hétéroclytes, d'espèces à caractères insuffisants et inexacts, sont, pour les savants, les véritables écuries d'Augias, où toute sagacité est en déroute, où tout savoir devient inutile.

« Parmi ces faux naturalistes, parmi ces ouvrages de basse érudition scientifique, il faut y [*sic*] placer Risso et y [*sic*] ranger ses travaux.

« Ecrivain fécond, mais sans jugement, innovateur infatigable, mais absurde, Risso a embrassé dans ses écrits presque toutes les branches de l'histoire naturelle, sans en avoir bien traité une seule.

« Tristes produits d'une imagination vive, mais désordonnée, ses travaux sont les enfants de cette « folle du logis », auxquels n'ont présidé ni discernement ni jugement; la classification détestable de ses familles, la coordination fausse de ses genres, non moins que l'inexactitude de ses synonymies, l'appréciation erronée de ses caractères, sont autant de preuves qui viennent démontrer que, dans ses écrits, tout y [*sic*] est faux, tout y [*sic*] est erreur.

« Il y a bien malgré tout quelquefois une observation neuve ou intéressante; l'on trouve cependant de temps en temps une rectification, une espèce qui ont leur mérite et leur valeur. Mais ces bonnes parties sont clairsemées, sont si rares, qu'elles font l'effet de quelques grains de blé dans un sac d'ivrée ».

Il est vrai que Bourguignat n'a pas cru devoir assurer une large diffusion à ce petit chef d'œuvre de la critique venimeuse, puisque la brochure le contenant (1861) n'a été tirée qu'à 100 exemplaires !

A côté de critiques aussi manifestement excessives, il faut souligner que d'autres malacologistes ont fait montre de plus d'indulgence ou de mesure à l'égard du naturaliste niçois. Caziot (1919) écrit ainsi : « It is evident that Antoine Risso was imperfectly acquainted with the works of his predecessors, and that he attempted to cover too wide a field, including plants, crustaceans, fish, mammals, birds, geology, mineralogy, etc., etc. One cannot be a universal naturalist » et, après s'être élevé contre les excès de plume de Bourguignat (« It is not the language which a master should employ with regard to the errors of his predecessors »), il conclut avec beaucoup de bon sens : « Draparnaud, the creator of French conchology, said truly that he who opens the way has a right to indulgence, even if he has done poorly; to glory if he has done well; and to gratitude when his successor has done better than he. Risso was not conscious of the errors that he committed ».

Enfin, les nombreuses dédicaces de genres ou espèces de mollusques dont Risso a été l'objet témoignent de la reconnaissance que lui ont manifestée plusieurs malacologistes moins critiques (1).

(1) Plutôt que les mentionner ici, j'ai transmis au Professeur Th. Monod toutes les indications de dédicaces malacologiques que j'avais pu réunir, afin qu'il puisse les incorporer à son inventaire général des dédicaces faites à Risso (Monod, *vide infra*).

Quant à lui, il n'a pas ménagé ses dédicaces de genres ou espèces malacologiques à des malacologistes ou naturalistes de divers pays (tels qu'Adanson, Allan, Argenville, Basterot, Beudant, Blainville, Bonnani, Borson, Brander, Brocchi, Bruguière, Cuvier, Defrance, Desmarest, Dicquemare, Donovan, Duméril, Favanne, Férussac, Fréminville, Gualtieri, Lamarck, Lesueur, Maton, Ménard, Montfort, d'Orbigny, Parkinson, Pfeiffer, Rafinesque, Renier, Schröter, Sowerby et Turton) qu'il faut parfois reconnaître sous des déformations orthographiques surprenantes !

LA COLLECTION RISSO

Risso garda chez lui, à Nice, la quasi totalité (2) de ses spécimens malacologiques, bien qu'il ait écrit en tête de son ouvrage de 1826 : « Mes nouveaux genres ou espèces de mollusques et coquilles seront déposés au Muséum d'histoire naturelle, pour que les personnes qui s'occupent de zoologie puissent s'assurer jusqu'à quel point mes observations sont exactes » et encore, en 1845 : « J'ai envoyé les espèces au muséum d'histoire naturelle à Paris pour qu'on puisse s'assurer qu'elles vivent dans la méditerranée, personne ne m'ayant demandé à les voir ».

Après sa mort encore, cette collection resta dans sa maison; elle subit là de graves dommages et Caziot (1919) qui visita cette collection attribue ces dommages à l'incompétence et à la négligence des descendants d'Antoine Risso, ce qui n'est nullement prouvé.

Le 25 mars 1927 enfin, *albo notanda lapillo,* Mr. Joseph Risso faisait don au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris des « Spongiaires, Polypiers et Mollusques » (Registre d'entrées du Laboratoire de Malacologie) d'Antoine Risso. Il est évident que le maintien de sa collection pendant plus d'un siècle hors d'un musée public (rendant cette collection quasi inconsultable pour les spécialistes) a gravement desservi l'œuvre de Risso. On connaît peu de malacologistes ayant pu consulter cette collection dans sa maison de Nice, de son vivant ou après sa mort. On peut citer par exemple T. Allan vers 1816, Leach vers 1820, H.B. Vérany, J.R. Bourguignat, peu avant 1861, le célèbre malacologiste nord américain W.H. Dall en 1906, et, quelques années plus tard, le Cdt. E. Caziot, alors Directeur du Musée municipal de Nice.

D'ailleurs Risso semble avoir été très jaloux de ses collections peut-être parce qu'il était peu enclin à la polémique (n'étant pas un *spécialiste*) ou parce qu'il admettait mal la critique. Non seulement il ne déposait pas ses types dans un musée, mais on sait combien Vérany lui a reproché de ne pas communiquer ses types de Céphalopodes : « Malgré toutes mes recherches et demandes faites à M. Risso, je n'ai encore pu observer les *O.* [*Octopus*] *tuberculatus* et *pilosus* de cet auteur », écrit-il par exemple (1841).

Je soulignerai ici une conséquence de ce manque d'assurance de Risso : il y a tout lieu de penser que c'est à cause même des critiques des plus acerbes de Vérany qu'il n'a pas *osé* publier son important travail sur les Céphalopodes de Méditerranée contenant 19 espèces qu'il estimait nouvelles. Sa famille le publia en 1854, mais il était trop tard : les espèces réellement

(2) Locard (1887) a vu son *Planaxis affinis* dans la collection du Muséum de Paris.

nouvelles avaient entre temps été publiées par d'autres auteurs, et en particulier, il faut bien le dire, par Vérany. D'ailleurs cet ouvrage posthume est passé largement inaperçu; 88 ans après sa parution, la révision de ces espèces de Risso (Adam, 1942) s'intitulait « A propos d'une publication peu connue de A. Risso, 1854 » !!

Chose plus curieuse, le legs de la collection Risso au Muséum de Paris en 1927 est lui-aussi resté très peu connu encore de nos jours, malgré la publication d'une révision partielle (trop tôt abandonnée) des Gastropodes Prosobranches par Fischer-Piette et Beigbeder (1943-1944) et d'une note sur *Lemintina cuvieri* Risso par Chavan (1944).

En quoi consista ce legs de 1927 ? A côté d'un certain nombre de coquilles exotiques ou tout au moins étrangères aux Alpes-Maritimes et à leur voisinage, espèces décrites par d'autres que Risso et ne nous concernant pas ici, j'ai trouvé dans les tiroirs du Laboratoire de Malacologie contenant cette collection plusieurs lots décollés de leurs cartons le plus souvent, accompagnés de leur étiquette d'origine et susceptibles d'être des lots types; certains étaient déjà marqués comme types à la suite de la révision partielle de Fischer-Piette et Beigbeder, mais nous verrons plus loin que certaines de leurs désignations doivent être annulées. Dans ces tiroirs, on trouve principalement des Gastropodes Prosobranches et des Pélécypodes, ainsi que de très rares Amphineures, Scaphopodes et Opisthobranches Céphalaspides. De rares types ont aussi été retrouvés dans la collection générale du Laboratoire. Quant aux Pulmonés, ils étaient conservés dans des tiroirs de la Galerie de Zoologie du Muséum : déjà révisés par Bourguignat (1861) et Caziot (1919), ils l'ont été une troisième fois, à ma demande, par H. Chevallier (1976).

Aucune trace des Céphalopodes et Nudibranches, ce qui peut résulter de leur élimination après dessiccation ou attaque par le liquide conservateur : cette hypothèse reste très probable puisque l'on constate la même disparition pour les autres groupes normalement conservés dans un liquide : Limaces, Ascidies et Polychètes notamment.

De façon plus inattendue, on ne trouve presque rien, dans la collection Risso du Muséum, concernant les types des mollusques dits « fossiles »; seules 8 de ces espèces sur 142 sont représentées d'une manière ou d'une autre dans cette collection : 6 Prosobranches (*Patella cancellata, P. favaniana, Murex bicristatus, Turritella bisulcata, Cerithium suturale, Crepidula candida*) et 2 Pélécypodes (*Venus crenulata* et *Arctoe parckinsonia*). Leur séparation d'avec les espèces récentes s'est-elle faite avant ou après le legs de 1927 ? Rien ne permet de le dire, mais on voit qu'elle a été faite très méthodiquement (8 oublis), et il est difficile de croire qu'elle n'avait pas pour but de leur donner une autre destination muséographique et qu'il s'agissait de les détruire. Bien que mes enquêtes au Laboratoire de Paléontologie du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, à l'Ecole des Mines et au Musée Barla de Nice n'aient apporté aucune lumière sur le sort de ces mollusques fossiles de Risso (pas plus d'ailleurs que sur les autres mollusques manquants), j'ai donc l'intime conviction qu'ils seront retrouvés un jour ou l'autre à un endroit où ils n'ont pas été cherchés, peut être avec une partie au moins des mollusques « sub-fossiles » de Risso (dont seulement un sur deux environ manque en collection actuellement).

A ce sujet, je soulignerai aussi le fait que les notions de coquilles fossiles et de coquilles subfossiles sont peu claires chez Risso, auquel on a reproché leur emploi parfois discutable. Ainsi Allan (1818) écrit au sujet des mollusques de la presqu'île du Saint Hospice (puits Risso) « The shells were here discovered in such a perfect state, that when Risso presented them as fossil productions in Paris, his veracity was somewhat questioned » (p. 446), peu après que Brocchi (1814) ait noté « il signor Risso non abbia avuto intenzione di fare esprimere al vocabolo *fossile* quella idea che gli vieme applicata del commune de naturalisti » (vol. 2, p. 436).

Même parmi les groupes représentés dans la collection Risso du Muséum, de nombreux types manquent ou ne peuvent être identifiés. Certains manquent depuis longtemps, car Vérany (1845), Bourguignat (1861) et Caziot (1919) signalaient déjà leur disparition (destruction, perte de l'étiquette, ou parfois emprunt sans retour ?). Caziot allait jusqu'à écrire « It is impossible now to recognize the greater part of specimens which served Risso as types » et je dois dire que près de 60 ans après, cette affirmation s'impose plus encore.

LES TAXA MALACOLOGIQUES D'A. RISSO

Les diagnoses de Risso sont sommaires et souvent ambiguës, tandis que les illustrations (sauf en 1854) sont rares et souvent très idéalisées. Cette relative pauvreté de l'iconographie a évidemment joué contre son œuvre malacologique. Ce qui est d'autant plus déplorable que la Bibliothèque Centrale du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris possède depuis 1927 un ensemble très important (près de 200 planches) d'aquarelles et lavis inédits des mollusques de Risso. Un inventaire détaillé de ces planches a été donné par Monod (1931). Les remarques suivantes compléteront cet inventaire. Ces planches sont l'œuvre de Philippe Gény, comme le montrent diverses signatures visibles aux planches 4, 20, 21, 25 à 28, 41 et 45. De plus ces planches sont, au moins en partie, nettement postérieures à l'ouvrage principal de Risso (1826) : en effet, le nom de Gény est suivi de 43 (= 1843) sur les planches 20, 28 et 41, et de 44 (= 1844) sur la planche 4. Un certain nombre de ces figures ne correspond aucunement aux diagnoses de Risso : les dessins de Gény ayant été faits d'après nature plus de 15 ans après les diagnoses, ces erreurs ne font probablement que traduire le fait que plusieurs mélanges s'étaient déjà produits dans la collection d'Antoine Risso de son vivant.

Il était bien sûr des plus intéressants de publier celles des figures peintes (plus de 250) se rapportant à des espèces décrites par Risso, à l'exception des figures de Céphalopodes actuels déjà reproduites (*in* Risso, 1854) : c'est maintenant chose faite avec les planches jointes.

Cette difficulté étant ainsi considérablement réduite, il faut maintenant parler du problème fondamental de cette révision : quels sont, parmi les taxa présentés comme nouveaux par Risso, ceux qui le sont réellement ? Nous allons voir que les méthodes taxinomiques de Risso soulèvent à ce sujet plusieurs difficultés. Férussac n'écrit-il pas, dès 1827, à propos du volume 4 (1826) de Risso : « ... les découvertes sont semées dans ce livre comme la pluie et le beau temps dans l'almanach de Bâle. (...) ... comment se débrouiller dans ce chaos ? Comment reconnaître ce qui est réellement nouveau ? ».

Risso, on s'en aperçoit vite, fait suivre beaucoup trop souvent les taxa de ses ouvrages par « N. » : ce *Nobis*, contrairement à ce que certains ont cru, est loin

de signifier toujours que le taxon est nouvellement décrit (1). Tantôt c'est bien le cas, tantôt seule l'attribution générique est nouvelle, tantôt enfin c'est pure fantaisie (ou lapsus ?) et il y a ainsi un nombre non négligeable de fausses espèces nouvelles à éliminer (2).

Les cas les plus simples sont ceux où Risso, tout en indiquant (N.) se réfère à l'auteur de l'espèce, quoiqu'il le fasse si mal que cette référence se change parfois en rébus : « All. 33, 1, IX, 2 » ne se traduit pas à première lecture par « Allan, 1818 : 459 (*tiré à part :* 33), n° 1, pl. 9, fig. 2 ».

Des cas beaucoup plus graves sont ceux où il « annexe » purement et simplement des espèces préexistantes, en les changeant ou non de genre et *sans la moindre référence* à leur auteur. Ces cas sont d'une mise en évidence très difficile puisque rien ne signale *a priori* ces espèces comme non nouvelles, et je n'affirme donc pas avoir détecté l'ensemble de ces fausses espèces nouvelles. Voici la liste des espèces que j'ai réussi à rendre à leur véritable auteur.

Espèces « annexées » sans changement de genre

Les auteurs réels de ces espèces prétendues nouvelles sont les suivants :

Doris caerulea : Montagu, 1804
Donax castanea : Montagu, 1803
Buccinum corniculum : Olivi, 1792
Ranella costata : Born, 1793
Cerithium costulatum : Da Costa, 1779
Buccinum elegans : Brocchi, 1814
Cypraea europea : Montagu, 1808
Murex imbricatus : Brocchi, 1814
Buccinum polygonum : Brocchi, 1814
Trochus tenuis : Montagu, 1803
Murex triangularis : Allan, 1818
Trochus tuberculatus : Da Costa, 1779
Mitra zonata : Marryat, 1817.

Espèces « annexées » après changement de genre

Les références réelles de ces espèces prétendues nouvelles sont les suivantes :

Speo bifasciatus : Voluta bifasciata Gm., 1790
Turritella cancellata : Turbo cancellata Broc., 1814
Otavia corallina : Trochus corallinus Gm., 1790
Mitra cornicula : Voluta cornicula L., 1758
Lembulus deltoideus : Nucula deltoidea Lmk., 1758
Alvania discors : Turbo discors Allan, 1818
A. discrepans : T. discrepans Allan, 1818
Cerithium granulosum : Murex granulosus Broc., 1814
Fistulana hians : Pholas hians Renier, 1804.
Helicella hispida : Helix hispida L., 1758
Jaminia multidentata : Pupa multidentata Olivi, 1792
Turbonilla plicatula : Turbo plicatulus Broc., 1814
Turritella plicatula : Turbo plicatulus Broc., 1814
Nacca punctata : Nerita punctata Chemn., 1789
Alvania reticulata : Turbo reticulatus Montagu, 1807
Arctoe reticulata : Lucina reticulata Poli, 1795.
Cerithium reticulatum : Strombiformis reticulatum Da Costa, 1779
Abra sinuosa : Mya sinuosa Allan, 1818
Speo tornatilis : Voluta tornatilis L., 1758
Turbinella triplicata : Murex triplicatus Allan, 1818
Octopus tuberculatus : Ocythoë tuberculata Rafinesque, 1814
Alvania verrucosa : Turbo verrucosus Allan, 1818.

Ces 35 espèces « annexées » sont donc autant d'espèces pour lesquelles il ne peut y avoir de matériel type de Risso. C'est pourquoi deux désignations de types de Risso faites par Fischer-Piette et Beigbeder (1943-1944) doivent être annulées (*Mitra cornicula* et *Turbinella triplicata*); trois autres espèces, marquées ou non N. par Risso mais accompagnées d'une référence à leur auteur réel sont d'ailleurs dans le même cas : *Fusus conulus,* (Olivi, 1792), *Purpura reticulata* (Olivi, 1792) et *Planaxis trifasciata* (Gm., 1790).

Dernière remarque sur la taxinomie de Risso : dans de nombreux cas, il donne inutilement un nouveau nom à une espèce déjà décrite et dont il indique la référence bibliographique, sans jamais essayer de justifier ce changement ! Ces cas sont signalés dans l'inventaire alphabétique du présent travail.

Enfin, à titre de curiosité, il faut signaler que Risso a décrit parmi les Ascidies une ponte de Gastropode : *Phallusia urtica* Risso, 1826.

MATERIEL TYPE. PROBLEMES DE PRIORITE

Risso n'a évidemment désigné de types ni pour ses genres ni pour ses espèces. Chose plus grave, il ne précise jamais le nombre de spécimens du lot servant de base à ses nouveaux taxa, et on ignore donc s'il n'y a pas eu soustraction ou addition ultérieures. Ceci exclut la désignation d'holotypes, même lorsqu'*actuellement* le matériel reconnu typique ne comporte qu'un spécimen (ICZN article 73 a) : on ne peut parler d'holotype ou de paratype de Risso (ceci est vrai aussi pour ses travaux sur les autres groupes), contrairement à ce qui a été fait en particulier par Fischer-Piette et Beigbeder (1943-1944).

On peut tout au plus considérer les spécimens présumés typiques comme des *syntypes* (ICZN article 73 c), et à condition d'admettre qu'il n'y a eu ni addition, ni substitution. A cet égard, la présence de l'étiquette d'origine peut être considérée comme décisive pour la reconnaissance du matériel qui lui est associé comme matériel type, si ce matériel correspond bien à la diagnose.

Dans 111 cas, et principalement quand un syntype avait la dimension indiquée par Risso dans la diagnose de l'espèce, j'ai désigné un *lectotype;* les autres syntypes du même lot, s'il y en a, deviennent alors des *paralectotypes.*

Les indications concernant les localités types sont dans la plupart des cas très imprécises ou nulles dans les travaux de Risso : je les ai reproduites très exactement pour chaque espèce, en les précisant un peu à chaque fois que c'était possible.

Comme c'était à prévoir, un certain nombre de problèmes de priorité sont soulevés par cette révision des mollusques de Risso. Ils sont essentiellement de deux ordres.

(1) Quand une diagnose est *suivie* par « N. », cela signifie que cette diagnose est originale. L'espèce concernée peut alors ne pas être nouvelle.

(2) Inversement d'ailleurs, il lui arrive d'omettre ce N. pour des genres nouveaux (*Gibbula, Eulima*), pour des espèces qu'il change de genre (*Gibbula magus* et *G. verticosa*) ou, mieux encore, pour des espèces nouvelles (*Ranella pyramidata, Nacca fasciata*).

Les premiers concernent des espèces de Risso ou d'Allan (1) qui se révèlent être prioritaires sur les binômes actuellement utilisés pour désigner ces espèces : ces derniers binômes étant souvent d'un emploi très général, il est problématique de leur substituer des noms aussi anciens. Plusieurs de ces cas seront soumis à la décision de la Commission. Parfois aussi la révision des espèces de Risso amène à en restreindre ou à en redéfinir la signification.

Acanthochiton aeneus (Risso, 1826, sous *Acanthochites*) = *A. discrepans* (Brown, 1827), non *A. communis* (Risso, 1826) qui est *A. fascicularis* (L., 1767).

Acanthochiton fascicularis (L., 1767) = *Acanthochites communis* Risso, 1826, non *Acanthochites aeneus* Risso, 1826.

Bathyarca grenophia (Risso, 1826, sous *Arca*) = *B. pectunculoides* (Scacchi, 1833).

Emarginula adriatica Costa, 1829 = *E. papillosa* (non Risso, 1826) auct., car *E. papillosa* Risso, 1826 (non auct.) est synonyme d'*E. huzardi* Payr., 1826.

Alvania discors (Allan, 1818, sous *Turbo*) = *Turbo discrepans* Allan, 1818 = *A. montagui* Payr., 1826 = *A. boria* Risso, 1826 = *A. mediterranea* Risso, 1826 = *A. ferruginea* Risso, 1826 = *A. crassicostata* Risso, 1826 = *A. sardea* Risso, 1826.

Alvania lineata Risso, 1826 = *A. nodulosa* Risso, 1826 = *A. costulosa* Risso, 1826.

Cerithium lividulum Risso, 1826 = *C. mediterraneum* Desh., 1843 = *C. rupestre* (non Risso, 1826) auct.

Cerithium rupestre Risso, 1826 (non auct.) : non *C. lividulum* Risso, 1826 nec *C. mediterraneum* Desh., 1843.

Epitonium aculeatum (Allan, 1818, sous *Turbo*) = *Scalaria muricata* Risso, 1826 = *S. cantrainei* Weinkauff, 1866.

Polinices pulchella (Risso, 1826, sous *Natica*) = *P. poliana* Delle Chiaje, 1826 = *P. alderi* (Forbes, 1838).

Typhis fistulatus (Risso, sous Murex) = *Typhis* (*Typhinellus*) *sowerbyi* Brod., 1833 = *T. tetrapterus* Brown.

Hinia turulosa (Risso, 1826, sous *Planaxis*) = *Nassarius edwardsi* P. Fischer, 1882.

Marginella mitrella Risso, 1826 = *M. secalina* Phil., 1836.

Mangelia fuscata Desh., 1837 = *M. ginnania* (non Risso, 1826) auct., car *M. ginnania* Risso, 1826 (non auct.) est synonyme d'*Haedropleura septangularis* (Montagu, 1803).

Mangelia lineolata Risso, 1826 = *M. multilineolata* Desh., 1832.

Hypselodoris villafranca (Risso, 1818, sous *Doris*) = *H. gracilis* Rapp, 1827 = *Doris caerulea* (non Montagu, 1804) Risso, 1826.

Dendrodoris guttata (Risso, 1826, sous *Doris*) = *Dendrodoris grandiflora* (Rapp, 1827).

(1) Thomas Allan, qui décrivit (1818) un certain nombre d'espèces que Risso l'avait aidé à récolter dans les gisements des environs de Nice. Dans l'un des dossiers Risso (MS. 2052) de la Bibliothèque Centrale du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, j'ai eu la surprise d'identifier les premières épreuves des 2 planches de mollusques de l'article d'Allan (1818), annotées de la main de Risso. Ce document a été d'un intérêt considérable pour la révision de certaines espèces de Risso ou d'Allan.

Enfin, d'autres problèmes de priorité concernent les espèces de Risso synonymes d'espèces de Payraudeau. L'ouvrage de Payraudeau a généralement été considéré comme antérieur à celui de Risso, ou du moins les noms de Payraudeau ont été utilisés de préférence à ceux de Risso; en fait rien ne prouve l'ordre de parution des deux ouvrages et la préférence pour les noms de Payraudeau ne fait peut être que traduire le fait que les illustrations qu'il a publiées sont de meilleure qualité !

La très officielle *Bibliographie de la France* a signalé la parution du livre de Risso (vol. 4) le 8 novembre 1826 (dans son numéro 89, p. 939) alors que le livre de Payraudeau n'y est cité que le 21 février 1827 (dans son numéro 15, p. 162). Bien que ceci ne reflète peut être que des délais différents d'acheminement ou des dates différentes d'envoi, on voit qu'il y a là un problème à résoudre (soit par d'autres preuves, soit par une décision de la Commission), et que l'habitude de considérer Payraudeau (1826) comme antérieur à Risso (1826) n'est pas des mieux fondées (2). Le statut relatif des espèces suivantes reste donc actuellement en suspens :

RISSO, 1826	PAYRAUDEAU, 1826
Emarginula depressa	*Emarginula huzardi*
Gibbula morio	*Clanculus jussieui*
G. schroeterius	*Clanculus jussieui*
G. pygmaea	*Gibbula racketti*
Phorcus margaritaceus	*Gibbula (Phorcus) richardi*
Natica marmorata	*Polinices guillemini*
Murex rudis	*Ocenebra blainvillei*
Mitrella marminia	*Pisania orbignyi*
Mangelia poliana	*Rissoina bruguieri*
M. reticulata	*Rissoina bruguieri*
Ostrea curvata	*Ostrea stentina*

CONCLUSION

Du présent travail, il résulte que Risso n'a pas proposé moins de 515 taxons spécifiques et 57 taxons génériques nouveaux parmi les mollusques actuels et fossiles, marins aussi bien que non marins. Mais la collection Risso du Muséum ne montre aucune trace de 330 de ses 515 espèces; parmi les 185 autres espèces, 14 étiquettes originales ne sont accompagnées par aucun matériel ou ne sont pas accompagnées par le matériel correspondant. 111 lectotypes sont désignés dans l'inventaire alphabétique qui suit.

On a pu voir par de nombreux exemples que Risso avait beaucoup exagéré le nombre des espèces nouvelles par sa méconnaissance de la littérature spécialisée (il cite souvent de seconde main, avec toutes les erreurs que cette méthode comporte), par ses vues souvent très contestables et inconstantes sur la taxinomie, et par sa notion très fluctuante de l'espèce. Le résultat est que

(2) Parmi les manuscrits de Risso (cote 2052) de la Bibliothèque Centrale du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, on trouve (à la p. 155 du dossier « Systématique a ») un « Extrait du Catalogue descriptif et méthodique des mollusques de l'isle de Corse par C. Payraudeau 1828 [sic] » dans lequel Risso établit plusieurs synonymies interessantes entre ses espèces et celles de Payraudeau. Mais ce manuscrit n'étant pas daté, cela ne permet pas non plus d'établir la priorité.

bien peu d'espèces doivent porter le nom que leur a donné Risso.

Il est d'autant plus remarquable qu'il ait été si bien inspiré dans le domaine générique : on lui doit bien des genres aussi nécessaires et « prestigieux » que *Gibbula, Alvania, Mangelia, Neverita, Tricolia, Turbonilla, Truncatella, Duvaucelia, Barnea* ou *Lepidopleurus*. Pourquoi lui reprocher, comme Bourguignat (1861) le fait avec virulence, d'avoir pris la plupart de ces genres à Leach (Ms) ? Il les admet à bon escient, indique presque toujours qu'il les a empruntés au manuscrit de Leach (1), et a su parfois s'inspirer de la claire conception que Leach avait du genre pour en créer lui-même plusieurs. C'est peut être pour reconnaître cette dette envers Leach qu'il lui a dédié son genre *Leachia* (qui est malheureusement mal conçu, car composite !) ?

Et, qu'on le veuille ou non (comme Bourguignat qui écrivait « Il y a deux hommes en Risso : l'homme sous l'inspiration de Leach, puis l'homme lui-même, c'est à dire l'homme ignorant... »), ce sont avant tout les genres de Risso qui ont assuré au naturaliste niçois une place plus qu'honorable dans l'histoire de la Malacologie.

Remerciements

Je tiens à remercier Mr. le Professeur C. Lévi, Directeur du Laboratoire de Biologie des Invertébrés marins et Malacologie du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, qui m'a donné accès à la collection Risso conservée dans son Laboratoire; ceux et celles qui m'ont aidé à rechercher d'autres spécimens de Risso dans la collection générale de ce même Laboratoire : MM. P. Bouchet et S. Gofas, et Melle F. Danrigal; Mr. le Professeur Th. Monod et Mr. J.C. Hureau qui m'ont procuré quelques documents utiles; et MM. J.P. Chevalier et J. Roger qui ont bien voulu faire effectuer des recherches de spécimens fossiles de Risso (malheureusement non couronnées de succès) dans les collections du Laboratoire de Paléontologie du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris et dans celles de l'Ecole des Mines. Mr. P. Bouchet a fait, au sujet des Opisthobranches, d'utiles remarques dont j'ai tenu compte.

Mr. Y. Laissus, Conservateur de la Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, a bien voulu m'autoriser à reproduire les précieuses figures inédites des mollusques de Risso, peintes par P. Gény, et faisant partie des archives dont il a la charge : je lui en exprime ma très vive reconnaissance.

CATALOGUE DES TAXA MALACOLOGIQUES D'ANTOINE RISSO

Les entrées en caractères gras correspondent aux taxa considérés comme réellement introduits par Risso; celle en italique, aux *nomina nuda;* les autres, aux simples renvois, ou, lorsqu'elles sont entre crochets ,aux taxa prétendus nouveaux.

La signification des signes précédant les entrées est la suivante :

† espèce fossile
(†) espèce subfossile
* un ou plusieurs syntypes dans la collection Risso du Museum
(*) dans cette collection, on trouve l'étiquette d'origine de l'espèce, seule ou associée à un matériel sans rapport
** un lectotype est désigné dans cette collection.

[ABRA (Leach MS) « Risso », 1826].
= Genre de Scrobiculariidae abusivement attribué à Risso par certains auteurs, alors qu'il s'agit d'un genre créé par Lamarck (1818).

ACANTHOCHITES 1826 : 268.
= *Acanthochiton* Gray, 1821, Acanthochitonidae. Emendation invalide de ce genre de Gray, inspirée d'ailleurs d'*Acanthochaetes*, in Leach Ms (publié 1852).

† **acanthoides, Ammonites** 1826 : 12 (n° 26). « Marne chloritée, Mont-Chauve ».
Matériel type présumé perdu.

ACICULA 1826 : 81. Génotype : *A. eburnea* Risso, 1826. (non *Acicula* J.D.W. Hartmann, 1821).
= *Cecilioides* Férussac, 1814, Ferussaciidae (= *Caecilioides* Herrmannsen, 1846).

(†) * **acicula, Rissoa** 1826 : 121 (n° 289), pl. 4, fig. 60; Ms : pl. 14 (ici : pl. 8, fig. 48). « Région des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Rissoa auriscalpium* (L., 1766), Rissoidae, comme l'ont admis divers auteurs. 4 syntypes dans la collection Risso du Museum : 3 coquilles de 7 mm et 1 coquille de 6 mm (aucun ne correspond à la dimension indiquée par Risso : 10 mm). Curieusement les renvois indiqués par Risso concernent *Rissoa violacea* Desm., 1814 [« Desm. 8, 5, 1, 7 » = Desmarest 1814 : 8, n° 5, pl. 1, fig. 7; « Allan 36, III » = Allan 1818 : 36, n° 2, sic] : c'est un double lapsus car la *Rissoa acicula*, d'après diagnose et figures, n'a pas de rapport avec *R. violacea*. D'ailleurs la pl. Ms. 14 figure bien à la fois *R. acicula* et *R. violacea*.

actor, Argonauta [1845] : 4.
= *nomen nudum*, Argonautidae.

aculeata, Avicula 1826, 308 (n° 825). « Profondeurs madréporiques ».
= *Pteria hirundo* (L., 1758), Pteriidae. D'ailleurs Risso se réfère à « Pol., 221, XXXII, 17 » [= Poli 1792, vol. 2 : 221, pl. 32, fig. 17-20] qui correspond à *Mytilus hirundo* L. Matériel type présumé perdu.

[acuta, Rissoa « Risso » 1826 : 120 (n° 288); Ms : pl. 14].
= C'est bien *Rissoa acuta* Desm., 1814 comme l'indique le renvoi par Risso à « Desm. 8, VI, I, 4 » [= Desmarest, 1814 : 8, n° 6, pl. 1, fig. 4], dont le nom actuel est *Rissoa (Zippora) auriscalpium* (L., 1767), Rissoidae. La collection Risso du Muséum comporte 5 spécimens de 7 mm.

(1) Comme l'indique J.E. Gray dans la préface de Leach (1852), les premières 116 pages et les planches furent imprimées et diffusées en épreuves lors de l'interruption de l'impression en 1820, l'ouvrage n'étant finalement publié *in extenso* qu'en 1852. Parmi les genres de Leach publiés entre temps par Risso (1826) on trouve *Theba* (repris de *Teba,* Leach, p. 66) et *Jaminia* (repris de *Iaminia,* p. 96). Mais la circulation d'épreuves des 116 premières pages de Leach ne peut être invoquée pour rendre à Leach la paternité de ces deux genres sous leur orthographe d'origine (ICZN, article 9).

[acuta, Voluta « Risso » 1826 : 250 (n° 663); Ms : pl. 4].
= C'est en réalité la *Voluta acuta* Allan, 1818 : 461 (tiré à part : 35), n° 4, pl. 9, fig. 17, comme l'indique d'ailleurs Risso lui-même. L'espèce d'Allan est un fossile de la péninsule du St. Hospice [Cap Ferrat]. L'espèce n'a pas été retrouvée dans la collection Risso du Muséum.

† **adansonia, Turritella** 1826 : 111 (n° 265); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig 37). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

(†) **adolphia, Mitra** 1826 : 246 (n° 651); Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 8). « Se trouve subfossile. ».
= ? *Mitra* (*Mitra*) *cornicula* (L., 1758), Mitridae, selon la pl. Ms 4. Matériel type présumé perdu.

aeneus, Acanthochites 1826 : 269 (n° 716). « Sous les cailloux ».
= *Acanthochiton aeneus* Risso, 1826, Acanthochitonidae [= *Acanthochiton discrepans* (Brown, 1827)], espèce différente d'*A. communis* Risso, 1826 (cf. cette entrée). Leloup (1939) a montré une variation continue des caractères (granulations, forme des valves et du tegmentum) entre le Nord (côtes atlantiques européennes) et le Sud (côtes méditerranéennes d'Afrique), ce qui expliquerait la synonymie complexe et controversée de cette espèce. Matériel type présumé perdu.

† **affinis, Buccinum** 1826 : 163 (n° 418); Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 87). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

* * **affinis, Columbella** 1826 : 205 (n° 529). « Rochers peu profonds ».
= *Pyrene mercatoria* (L., 1758), Pyrenidae des Antilles, considéré à tort par Risso comme faisant partie de la faune de Méditerranée. Représenté dans la collection Risso du Muséum par 3 coquilles de 15, 13 et 13 mm, comme observé par Fischer-Piette et Beigbeder (1944). Ils qualifient abusivement d'holotype le spécimen de 15 mm : je le désignerai ici comme lectotype de *C. affinis* Risso, 1826, les deux spécimens plus petits étant donc les paralectotypes.

(†) **affinis, Cyclostoma** 1826 : 104 (n° 243). « Collines (...). Subfossile ».
= Bourguignat (1861) et Caziot (1919) ont signalé que le carton marqué *C. affinis* dans la collection de Risso portait alors à la fois *Cyclostoma elegans* Müller, 1774 et *C. sulcatum* Drap., 1805, Cyclostomatidae. Mais ce matériel type est présumé perdu.

(†) **affinis, Murex** 1826 : 194 (n° 500). « Rochers peu profonds. (...) se trouve subfossile ».
= (Non *Murex affinis* Eichwald, 1830). Matériel type présumé perdu.

† **affinis, Pecten** 1826 : 298 (n° 793). « Fossile dans le calcaire argileux ».
Matériel type présumé perdu.

(†) * * **affinis, Planaxis** 1826 : 175 (n° 449), Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 105). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ». (cf. plus bas).
= *Hinia incrassata* (Müller, 1776), Nassariidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944) : 4 syntypes de 15 à 11 mm, dont la coquille de 12 mm de la planche Ms 32 (que je désigne comme lectotype de *P. affinis* Risso, 1826) sont dans la collection Risso du Muséum. Chose à noter, l'une des coquilles est marquée « Nice », que l'on doit considérer comme localité type. Pour mémoire, on peut noter aussi que Locard (1887) estimait bonne l'espèce de Risso.

† **affinis, Pleurotoma** 1826 : 216 (n° 562); Ms : pl. 52 (ici : pl. 4, fig. 200). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

alba, Buccinum : cf. alba, Purpura 1826.

* * **alba, Purpura** 1826 : 167 (n° 427); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 90). « Régions profondes. Roulée par les vagues sur le rivage après de fortes tempêtes ».
= *Euthria cornea* (L., 1758), Buccinulidae. La collection Risso du Museum contient un seul spécimen (que je désigne comme lectotype de *Purpura alba* Risso, 1826), roulée et mesurant 43 mm, qui est celui de la diagnose originale et de la pl. Ms 32, comme l'ont déjà noté Fischer-Piette et Beigbeder (1944). J'ajoute que ce spécimen est étiqueté *Buccinum alba.*

albida, Patella 1826 : 261 (n° 693). « Régions coralligènes. (...) Rejetée sur les bords après la tempête ».
Matériel type présumé perdu.

(†) **albida, Pleurotoma** 1826 : 215 (n° 560); Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 193). « Régions coralligènes. (...) Se trouve subfossile ».
= (Non *Mangelia albida* (Desh., 1832). Matériel type présumé perdu.

† **alicia, Oniscia** 1826 : 183 (n° 471), pl. 6, fig. 77; Ms : pl. 54 (ici : pl. 11, fig. 190). « Fossile à Saint-Philippe ».
= *Morum* sp., Cassididae. Matériel type présumé perdu.

† **allania, Mactra** 1826 : 368 (n° 1014); Ms : pl. 84 (ici : pl. 12, fig. 227). « Fossile dans les terrains tertiaires ».
= Risso se réfère à All. 34, IX, 9, ce qui correspond à *Mactra lactea* Allan 1818 : 460 (tiré à part : 34), pl. 9, fig. 9, nom préoccupé par *Mactra lactea* Montagu. Le nom d'*allania* se trouve donc être un nom nouveau pour *M. lactea* Allan non Montagu, mais selon les diagnoses et figures (la pl. Ms 84 de Risso reproduit la figure 9 d'Allan) de cette espèce, il pourrait s'agir d'*Ervilia castanea* (Montagu, 1803), Mesodesmatidae. Matériel type présumé perdu.

† **allioni, Buccinum** 1826 : 164 (n° 420); Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 77). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

† **alpina, Ammonites** 1826 : 12 (n° 24); Ms : pl. LXX (ici : pl. 12, fig. 261), sous *A. alpinarina.* « Green-sand, Alpes-Maritimes ».
Matériel type présumé perdu.

[alucastrum, Cerithium « Risso » 1826 : 154 (n° 390); Ms : pl. 8].
= C'est le *Cerithium* (*Thericium*) *alucastrum* (Brocchi, 1814), Cerithiidae, comme l'indique d'ailleurs la référence donnée par Risso : « Brocchi, 438, 66, X, 4 » = Brocchi 1814 : 438, n° 66, pl. 4, fig. 10a-b : *Murex alucaster*, variété fossile de *Cerithium vulgatum* Brug., 1792. Le spécimen (de 29 mm) de la collection Risso appartient bien à cette espèce.

ALVANIA (Leach, Ms) Risso, 1826 : 140.
= *Alvania* (Leach Ms) Risso, 1826, Rissoidae. Génotype : *Alvania sardea* Risso, 1826 = *A. montagui* (Payr., 1826).

ambrosiaca, Eledone 1845 : 4 (*nomen nudum* à cette date); 1854 : 45, pl. 32 (le texte indique : pl. 21, fig. 1); Ms : pl. XXXIV (= pl. 32 de Risso, 1854). « Régions coralligènes ».
= ? *Eledone moschata* (Lmk, 1798) ou *E. cirrhosa* (Lmk., 1798, Octopodidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

† **ancyloïdes, Voluta** 1826 : 251 (n° 664), pl. 10, fig. 141; Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 10). « Fossile à Magnan ».
= Mitridae d'après les figures. Matériel type présumé perdu.

† **angulatum, Buccinum** 1826 : 163 (n° 419), Ms : pl. 31 (ici : pl. 9, fig. 82). « Fossile à la Trinité ».
= Nassariidae d'après la pl. MS. 31. Matériel type présumé perdu.

† **angulatus, Murex** 1826 : 194 (n° 501), Ms : pl. 43 (ici : pl. 10, fig. 161). « Régions coralligènes (...) se trouve subfossile ».
= (Non *Murex angulosus* Brocchi 1814 : 411, pl. 7, fig. 16). Matériel type présumé perdu.

angulatus, Pectunculus 1826 : 316 (n° 852). « Régions coralligènes ».
= *Glycymeris stellatus* Gm., 1790, Glycymeridae, selon Monterosato (1884). Matériel type présumé perdu.

angustistriata, Ammonites 1826 : 12 (n° 25); Ms : pl. 53 (ici : pl. 12, fig. 255). « Marne chloritée. Mont Chauve ».
Matériel type présumé perdu.

ANNA, 1826 : 214.
= Genre de Gastéropodes Prosobranches (? Buccinidae) énigmatique, la diagnose du genre et d'*A. massena,* génotype et monotype, étant insuffisantes, en l'absence du matériel type, présumé perdu. Serait synonyme de *Cantharus* Röding, 1798, *fide* Dall 1918 (cf. entrée : *massena, Anna*).

† **antiqua, Ammonites** 1826 : 11 (n° 21); Ms : pl. LVII (ici : pl. 12, fig. 262). « Calcaire alpin, col de Monnier ».
Matériel type présumé perdu.

† **antiqua, Ampularia** 1826 : 152 (n° 384). « Fossile aux environs de Contes ».
Matériel type présumé perdu.

† **antiqua, Psammobia** 1826 : 375 (n° 1033). « Fossile dans divers terrains tertiaires ».
Matériel type présumé perdu.

antiqua, Venus : cf. antiquata, Venus

(†) **antiquata, Venus** 1826 : 357 (n° 976); Ms : pl. 87 (ici : pl. 12, fig. 239), sous *V. antiqua.* « Régions madréporiques » (...). Se trouve subfossile ».
= (Non *Venus antiqua* King, 1832). Matériel type présumé perdu.

† **antiquatus, Taras** 1826 : 344 (n° 934), pl. 12, fig. 167. « Fossile à la Trinité ».
= *Diplodonta* sp., Ungulinidae. Matériel type présumé perdu.

ARCTOE, 1826 : 361.
= *Dosinia* Scopoli, 1777, Veneridae (= *Arctoa* Hermannsen, 1846, Index Gen. Malacoz., 1 : 76 : emendation invalide).

† **arctoe, Venus** 1826 : 360 (n° 989). « Fossile à la Trinité ».
= Risso donne deux renvois bibliographiques, l'un à Brocc. 560, 26, XIII, 12 » [= Brocchi, 1814 : 560, n° 26, pl. 13, fig. 12 : *Venus pectunculus* L.] et « All., 31, 5 » [= Allan, 1818 : 457 (tiré à part : 31), n° 5 : *Venus pectunculus* L.] qui indiquent que l'espèce de Risso serait *Pitar rudis* (Poli, 1795) puisque Monterosato par examen du matériel de Brocchi a admis cette synonymie avec l'espèce de Poli. Matériel type présumé perdu.

(†) **arcuata, Alvania** 1826 : 146 (n° 147). « Se trouve subfossile ».
= Rissoidae. Matériel type présumé perdu.

* * **argenvillea, Arca** 1826 : 311 (n° 835), pl. 12, fig. 172; Ms : pl. 68 (ici : pl. 12, fig. 223), sous *A. argenvillia.* « Grandes profondeurs ».
= *Arca tetragona* Poli, 1795, Arcidae. L'unique spécimen de la collection Risso du Muséum n'est pas celui dont Risso indique la dimension, puisqu'il mesure 9 mm sur 4 mm. Je le désigne cependant ici comme lectotype d'*A. argenvillea* Risso, 1826.

† **asper, Murex** 1826 : 200 (n° 517) : Ms : pl. 51 (ici : pl. 10, fig. 179), sous *Cancellaria aspera.* « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

aspera, Cancellaria cf. asper Murex.

† **assimile, Cerithium** 1826 : 156 (n° 394); Ms : pl. 8 (ici : pl. 8, fig. 23). « Fossile à la Trinité et à Saint Philippe ».
Matériel type présumé perdu.

audiberti, Fusus 1826 : 210 (n° 545), pl. 6, fig. 76; Ms : pl. 48 (ici : pl. 10, fig. 173). « Fossile à Magnan ».
(1) Matériel type présumé perdu.

(†) * **auricula, Lymnea** 1826 : 95 (n° 220). « Vallons et fontaines (...) Subfossile ».
= *Lymnaea ovata* Drap., 1805, Lymnaeidae, selon Chevallier (1976). 5 syntypes dans la collection Risso du Muséum, mesurant de 6 à 20 mm.

(†) **balbisianum, Buccinum** 1826 : 160 (n° 409); Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 79). « Subfossile ».
= Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

BARNEA (Leach Ms) Risso, 1826 : 376.
= *Barnea* (Leach Ms) Risso, 1826, Pholadidae (= *Barnia* Leach 1852, Syn. Moll. Great Brit. : 254). Génotype : *Barnea candida* (L., 1758).

(1) cf. addendum, p. 150.

† **basteroti, Trochus** 1826 : 131 (n° 323)); Ms : pl. 36 (ici : pl. 9, fig. 126). « Sub-pétrifiés dans la marne chloritée de Brans ».
Matériel type présumé perdu.

† **beccaria, Buccinum** 1826 : 165 (n° 423), pl. 6, fig. 60; Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 88), sous *B. becaria* (sic). « Fossile à la Trinité ».
= Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

beudantiana, Planaxis 1826 : pl. 9, fig. 125.
= Cette espèce est figurée par Risso, mais il n'en donne pas de diagnose. Comme l'ont admis plusieurs auteurs, c'est probablement *Hinia costulata* (Renier, 1804) = *Nassa cuvieri* Payr., 1826, Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

† **bicinctus, Cerithium** 1826 : 156 (n° 396); Ms : pl. 8 (ici : pl. 8, fig. 29). « Fossile à la Trinité ».
= Cerithiidae. Matériel type présumé perdu.

* * **bicolor, Gibbula** 1826 : 135 (n° 332); Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 134). « Régions des fucus ».
= *Gibbula ardens* (von Salis, 1793), Trochidae. Dans la collection Risso du Muséum : 5 syntypes de 8 à 11 mm de hauteur, conformes à la pl. Ms 38 et étiquetés *Trochus bicolor* (non *T. bicolor* Risso 1826 : 127 qui est *Calliostoma laugieri* Payr., 1826). Je désigne le plus grand (ayant la dimension indiquée par Risso) comme lectotype de *Gibbula bicolor* Risso, 1826. Un autre tube contient, par erreur, sous le nom *G. bicolor,* 4 *Gibbula adansoni* de 5 à 9 mm et 1 *Clanculus cruciatus.*

(†) **bicolor, Murex** 1826 : 194 (n° 499); Ms : pl. 43 (ici : pl. 10, fig. 149). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= ? *Fusinus pulchellus* (Phil., 1844), Fasciolariidae, d'après la pl. Ms 43. Matériel type présumé perdu.

* **bicolor, Pleurotoma** 1826 : 214 (n° 557); Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 199). « Régions des algues ».
= *Philbertia purpurea* (Montagu, 1803), Turridae : 2 syntypes de 20 mm dans la collection Risso du Muséum (alors qu'il indique 12 mm !) Dans le même tube on trouve 2 *Mangelia multilineolata* Desh. égarées.

* **bicolor, Trochus** 1826 : 127 (n° 306), pl. 9, fig. 117; Ms : pl. 35 (ici : pl. 9, fig. 119). « Profondeurs coralligènes ».
= dans la collection Risso du Muséum, on constate sous ce nom un mélange de deux espèces de Trochidae : *Jujubinus exasperatus* (Pennant, 1777), 2 spécimens de 5 mm, et *Jujubinus striatus* (L., 1766), 3 spécimens usés de 6 mm. Ce mélange a pu être fait par Risso lui-même. La planche Ms 35 représente la première de ces deux espèces, et la pl. 9 fig. 117 une troisième espèce. De plus, aucun des spécimens précités ne correspond bien à la dimension indiquée par Risso, 7 mm.

†** **bicristatus, Murex** 1826 : 192 (n° 494). « Fossile à Magnan ».
= *Ocenebra erinacea* (L., 1758), Muricidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1943) : 1 spécimen ayant même longueur que celui de la diagnose de Risso (37 mm) existe dans la collection Risso du Muséum; je désigne cet unique spécimen comme lectotype de *Murex bicristatus.*

bidentata, Saraphia 1826 : 84 (n° 189). « Sous les pierres ».
Matériel type présumé perdu; Bourguignat (1861) et Caziot (1919) l'indiquaient déjà.

[bifasciatus, Speo « Risso » 1826 : 236 (n° 619), pl. 8, fig. 107].
= C'est la *Voluta bifasciata* Gm., 1790 changée de genre par Risso; son nom actuel est *Actaeon tornatilis* (L., 1767), Actaeonidae.

* * **bilamillata, Turbinella** 1826 : 212 (n° 551); Ms : pl. 53 sous *T. trilamillata* (sic). « Régions coralligènes ».
= *Vasum capitellum* L., 1758, Vasidae des Antilles, selon Fischer-Piette et Beigbeder (1944). Ils notent aussi que l'unique spécimen de la collection Risso du Muséum, mesurant 31,5 mm de long est très usé, et correspond à celui de la diagnose de Risso, qu'il est étiqueté *Turbinella trilaminata* (sic) et qu'il provient sans doute (par inadvertance) d'un lot correctement étiqueté par Risso *T. capitellum* Lmk. Je désigne ici ce spécimen comme lectotype de *T. bilamillata,* Risso, 1826.

† **biplicata, Marginella** 1826 : 232 (n° 608). « Moyennes profondeurs (...). Se trouve subfossile ».
= ? *Ringicula auricula* (Ménard de la Groye, 1801), Ringiculidae, selon Monterosato (1884). Matériel type présumé perdu.

* * **biplicata, Mitra** 1826 : 242 (n° 635); Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 9 a). « Régions rocailleuses ».
= *Vexillum* (*Pusia*) *ebenus* (Lmk, 1811), Mitridae comme l'avaient déjà reconnu Fischer-Piette et Beigbeder (1944). 3 syntypes de 21, 17 et 13 mm sont dans la collection Risso du Muséum. Je désigne le spécimen de 21 mm comme lectotype de *M. biplicata* Risso, 1826.

** **biplicata, Volvaria** 1826 : 233 (n° 611). « Régions coralligènes ».
= *Persicula miliaris* (L., 1766), Marginellidae, comme l'avaient observé Fischer-Piette et Beigbeder (1944). 2 syntypes de 5 et 4 mm sont dans la collection Risso du Muséum. Je désigne celui de 5 mm comme lectotype de *V. biplicata* Risso, 1826.

† **biplicatum, Buccinum** 1826 : 163 (n° 416); Ms : pl. 31 (ici : pl. 9, fig. 75). « Fossile au vallon de la Sabatière ».
= Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

biradiata, Venus 1826 : 357 (n° 975); Ms : pl. 87 (ici : pl. 12, fig. 240). « Régions coralligènes ».
= (Non *Tapes biradiata* Desh., 1853). Selon divers auteurs il s'agirait de *Venus fasciata* (Da Costa, 1778), Veneridae qui peut en effet correspondre à la diagnose de Risso. La longueur indiquée (38 mm) et la figure Ms ne correspondent pas à cette espèce mais plutôt à *Venerupis aurea* (Gm., 1790), Veneridae. Le matériel type n'a malheureusement pas été retrouvé.

† **bisulcata, Gryphea** 1826 : 291 (n° 767); Ms : pl. 73 (ici : pl. 12, fig. 216). « Pétrifiée dans le calcaire argileux de la péninsule de Villefranche » [= Cap Ferrat].
Matériel type présumé perdu.

†* **bisulcata, Turritella** 1826 : 111 (n° 266); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 39). « Fossile à la Trinité ».
= *Turritella* sp., Turritellidae. Dans la collection Risso, du Muséum on trouve sous ce nom 4 coquilles incomplètes de 12, 13, 14 et 14 mm (Risso indique 32 mm dans sa diagnose) que l'on peut considérer comme des syntypes.

bisulcatus, Testacellus 1826 : 58 (n° 126). « Sous les pierres de nos collines ».
= *Testacella bisulcata* Risso, 1826 et *T. episcia* Bourg., 1861, Testacellidae; selon Bourguignat (1861) qui a trouvé dans la collection Risso deux bocaux de spécimens en alcool « dans un état déplorable de conservation ». Ce matériel type est présumé perdu.

bitentaculatus, Octopus 1854 : 61, pl. 24 (le texte indique pl. 28, fig. 1). « Rochers des bords ».
= ? *Octopus vulgaris* Lmk., 1798, Octopodidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

blainvillea, Tritonia 1818 : 371; 1826 : 35 (n° 84). « Sous les cailloux ».
= *Marionia blainvillea* (Risso, 1818), Tritoniidae. Bonne espèce admise par divers auteurs. Matériel type présumé perdu.

BOLMA, 1826 : 117.
= *Bolma* Risso, 1826, sous-genre d'*Astraea* Röding, 1798, Turbinidae. Type (par monotypie) : *Turbo rugosa* L., 1766.

* * **bonnaniana, Arca** 1826 : 311 (n° 833); Ms : pl. 68 (ici : pl. 12, fig. 224). « Régions coralligènes ».
= *Arca barbata* L., 1758, Arcidae. L'unique spécimen de la collection Risso du Muséum, qui mesure 35 sur 15 mm, n'est pas celui dont Risso donne la dimension. Je le désigne néanmoins ici comme lectotype d'*A. bonnaniana* Risso, 1826.

† **borniana, Mitra** 1826 : 246 (n° 652); Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 6). « Fossile à la Trinité ».
= Mitridae. Matériel type présumé perdu.

boria, Alvania 1826 : 140 (n° 348), pl. 9, fig. 132. « Régions coralligènes ».
= C'est *Alvania montagui* (Payr., 1826), Rissoidae, comme l'ont admis plusieurs auteurs, mais cette espèce est synonyme d'*A. discors* Allan, 1818 (cf. cette entrée). Matériel type présumé perdu.

† **borsonianum, Cerithium** 1826 : 155 (n° 392); Ms : pl. 8 (ici : pl. 8, fig. 22). « Fossile au vallon de Magnan ».
= Cerithiidae, *spec. dubia.* Matériel type présumé perdu.

† **boveus, Murex** 1826 : 200 (n° 516); Ms : pl. 44 (ici : pl. 10, fig. 155). « Fossile à Magnan ».
= ? *Ranella olearium* (L. 1758), Cymatiidae, d'après la pl. Ms 44 et la diagnose. Matériel type présumé perdu.

branderi, Solarium : cf. branderianum, Solarium.

† **branderianum, Solarium** 1826 : 139 (n° 345); Ms : pl. 38, sous *S. branderi* (ici : pl. 2, fig. 133). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

† **breislackia, Pleurotoma** 1826 : 218 (n° 569), pl. 17, fig. 93; Ms : pl. 52, sous *P. Breislachia* (ici : pl. 11, fig. 195). « Fossile à la Trinité ».
= Turridae. Matériel type présumé perdu.

brochi *(sic),* **Tergipes** 1818 : 373. « Sous les cailloux ».
= Espèce invalidée sous le n° 861 (Opinion 773. *Bull. Soc. zool. Nomencl.,* 23 : 84, 1966). Le matériel type n'a pas été retrouvé (ce qui serait sans grand intérêt compte tenu de l'opinion 773).

† **brongniartianus, Rostellaria** 1826 : 226 (n° 592), pl. 7, fig. 94; Ms : pl. 1, sous *R. brogniartii* (ici : pl. 8, fig. 1). « Fossile à la Trinité ».
= *Aporrhais* sp., Aporrhaidae. Matériel type présumé perdu.

† **bruguiera, Turritella** 1826 : 110 (n° 262); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 38). « Fossile à la Trinité ».
= Turritellidae. Matériel type présumé perdu.

(†) **buccinoïdea, Mitra** 1813 : 200 (*nomen nudum*); 1824 : 360 (*nomen nudum*); 1826 : 245 (n° 648), pl. 10, fig. 142; Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 5). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ». Risso (1813, 1824) l'indique du Puits Risso, à Grosueil (NW du Cap Ferrat).
= *Mitra (Mitra) cornicula* (L., 1758), Mitridae, d'après la fig. 142 (la pl. Ms 4 figure une autre espèce !). Matériel type présumé perdu.

† **bucklandius, Nautilus** 1826 : 9 (n° 11); Ms : pl. XLVI (ici : pl. 12, fig. 253). « Marne chloritée, Mont-Chauve ».
Matériel type présumé perdu.

BULLINA, 1826 : 51.
= (Non Férussac 1822 = Actaeonidae) = *Cylichna* Loven, 1846, Scaphandridae.

BUSIRIS, 1826 : 34.
= *Notarchus* Cuvier, 1817, Aplysiadae, puisque la seule espèce rangée par Risso sous *Busiris, B. griseus,* est synonyme de *Notarchus punctatus* Phil., 1836.

[caerulea, Doris « Risso » 1818 : 370, 1826 : 32 (n° 78)].
= Il s'agit, comme souvent chez Risso, d'un nom emprunté : *Doris coerulea* Montagu, 1804. Mais c'est en réalité une autre espèce que celle de Montagu qu'il décrit : *D. coerulea Risso,* 1818 (non Montagu, 1804) = *Hypselodoris villafranca* Risso, 1818, Chromodoridae, qui a pour synonyme postérieur *H. gracilis* Rapp, 1827.

† **canaliculata, Cassis** 1826 : 181 (n° 467); Ms : pl. 55 (ici : pl. 11, fig. 186). « Fossile à la Trinité ».
= Espèce voisine de *Cassis saburon* (Brug., 1792). Matériel type présumé perdu.

* **cancellata, Patella** 1826 : 266 (n° 708). « Fossile dans nos terrains tertiaires ».
= (Non *Patella cancellata* Gm., 1791, qui est un Acmaeidae). La collection Risso du Muséum contient, sous ce nom un spécimen de *Patella coerulea* L., 1758, de 31 sur 25 mm (hauteur : 7 mm), ne correspondant pas aux mensurations indiquées par Risso. Il n'est pas certain que ce soit un représentant de l'espèce de Risso.

[cancellata, Turritella « Risso » 1826 : 110 (n° 261), pl. 4, fig. 40].
= C'est le *Turbo cancellata* Brocchi 1814 : 377, pl. 7, fig. 8, comme le prouvent diagnoses et figures. Selon Rossi-Ronchetti (1955) cette espèce doit maintenant être appelée *Amaea* (*Clathroscala*) *cancellata* (Brocchi, 1814), Epitoniidae.

† **cancellatum, Buccinum** 1826 : 164 (n° 422), pl. 6, fig. 81; Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 76). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

† * * **candida, Crepidula** 1826 : 255 (n° 677), pl. 10, fig. 138; Ms : pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 15). « Régions coralligènes (...). Se trouve fossile » dans l'argile tertiaire ».
= Risso cite « Baster. 71, II, V, 10 » [= Basterot, 1825 : 71, n° 2, pl. 5, fig. 10] c'est à dire *Crepidula cochleare* Bast., 1825. Dans la collection Risso du Muséum on trouve le spécimen de la pl. Ms 5 (il mesure 23 mm sur 13 et je le désigne comme lectotype) et un autre spécimen de 13 mm sur 10).

CANTAREUS, 1826 : 64.
= *Cantareus* Risso, 1826, Helicidae (= *Canthareus* L. Agassiz, 1847 = *Cantharelus* Pallary, 1924). Génotype : *Cantareus naticoides* (Drap., 1801) = *Cantareus aperta* (Born, 1778).

† **carinata, Pyramidella** 1826 : 94 (n° 217); Ms : pl. 17 (ici : pl. 8, fig. 63 a). « Fossile à la Trinité ».
= Pyramidellidae, species dubia. Matériel type présumé perdu.

† **carinatum, Solarium** 1826 : 139 (n° 347); Ms : pl. 38 (ici : pl. 9, fig. 131). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

carinatus, Limax 1826 : 56 (n° 123). « Jardins et lieux incultes ».
= *Amalia carinata* (Risso, 1826), Limacidae (non *Limax carinatus* Leach, 1852, nec Orb., 1839), bonne espèce selon divers auteurs. Matériel type présumé perdu.

* **carnea, Pegea** 1826 : 88 (n° 200), pl. 3, fig. 29. « Sur les pierres (...) Reçue comme de nos environs » [= Nice].
= *Ferrussacia* (*Proceruliana*) *carnea* (Risso, 1826, Ferrussaciidae, espèce tunisienne probablement débarquée à Nice avec le grain (Bourguignat, 1861). Dans la collection du Muséum, on trouve 2 syntypes : une coquille brisée (dont ne restent que les 2 derniers tours) et mesurant 10 mm dans cet état, et une autre coquille marquée « *Pegea* », Pegée. Bourguignat (1861 : fig. 23-26) a refiguré le matériel type de cette espèce. *F.* (*P.*) *carnea* est le type du sous-genre *Pegea* de *Ferrussacia*, préoccupé par *Pegea* Savigny 1816 = *Salpa* Forskål, 1775.

[castanea, Donax « Risso », 1826 : 340 (n° 921)].
= C'est en fait *Donax castanea* Montagu, 1803, Mesodesmatidae, dont Risso a annexé le nom. Mais les 3 spécimens qui accompagnent maintenant l'étiquette originale de Risso sont sans rapport avec la diagnose de Risso : *Gastrana fragilis* (L., 1758), Tellinidae, ce qui résulte évidemment d'un mélange.

carinatus, Acanthochites 1826 : 269 (n° 715). « Sous les pierres du rivage ».
= *Acanthochiton* sp. indet., Acanthochitonidae. Selon les auteurs cette espèce a été reconnue bonne ou a été mise en synonymie avec *A. discrepans* (Brown, 1827) ou avec *A. fascicularis* (L., 1767) ce qui montre bien qu'elle est en fait indéterminable en l'absence du matériel type, présumé perdu.

* * **cavernosa, Chama** 1826 : 329 (n° 888); Ms : pl. 68 (ici : pl. 12, fig. 230). « Sur les rochers du rivage ».
= *Chama gryphoides* L., 1758, Chamidae. Dans la collection Risso du Muséum, il y a 3 syntypes : l'un est entier (je le désigne ici comme le lectotype de *C. cavernosa* Risso, 1826), tandis que les deux autres sont représentés chacun par une seule valve.

(*) **cemenelea, Theba** 1826 : 75 (n° 168). « Colline de Cimiez ».
= d'après Bourguignat (1861) et Caziot (1919), on trouvait bien sur les cartons de Risso portant ce nom 2 spécimens de *Theba cemenelea* Risso, 1826, mais aussi 1 spécimen d'*Helix carthusiana* Müller. Actuellement, dans la collection Risso du Muséum, l'étiquette originale de *Theba cemenelea* est accompagnée d'*Helicella* sans rapport avec l'espèce de Risso (selon Chevallier, 1976) : ces spécimens d'*Helicella* sont au nombre de 6 et leur hauteur varie entre 7 et 11 mm.

CEMORIA (Leach Ms) Risso, 1826 : 258.
= *Puncturella* Lowe, 1827, Fissurellidae (*Cemoria* Leach, 1852).

* **charlotia, Clausilia** 1826 : 86 (n° 194), pl. 3, fig. 22. « Sous les pierres des montagnes de Raus, d'Agel et de Vinaigrié ».
= *Granaria variabilis* (Drap., 1801), Pupidae, selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 3 syntypes dans la collection Risso du Muséum : 2 de 13 mm de hauteur et un plus grand dont ne restent que les 5 derniers tours.

charpentiera, Theba 1826 : 76 (n° 170). « Nos vallons ».
= Selon Bourguignat (1861) et Caziot (1919), il s'agit de *Theba rubella* Risso, 1826, Helicidae (variété blanc sale ou jaunâtre) qui, selon Chevallier (1976) = *Euomphalia strigella* (Drap., 1801). Matériel type présumé perdu.

† **chloritea, Hamites** 1826 : 11 (n° 19). « Marne chloritée, Mont-Chauve ».
Matériel type présumé perdu.

† **chloriteus, Fusus** 1826 : 210 (n° 548); Ms : pl. 50 (ici : pl. 10, fig. 172). « Dans l'argile chloritée » [celles du Mont Chauve, souvent citées par Risso ?].
Matériel type présumé perdu.

(†) **clarissa, Mangelia** 1826 : 222 (n° 582); Ms pl. 52, sous *Pleurotoma clarissa* (ici : pl. 11, fig. 196). « Subfossile ».
= ? *Mangelia albida* (Desh., 1832), Turridae, selon la diagnose et la pl. Ms 52. Matériel type présumé perdu.

clarissa, Pleurotoma : cf. clarissa, Mangelia.

† **clathrata, Pyrula** 1826 : 213 (n° 555), pl. 7, fig. 90; Ms : pl. 53 (ici : pl. 11, fig. 207). « Fossile à Saint Philippe ».
= *Ficus* sp., Ficidae. Matériel type présumé perdu.

cocco, Octopus « Risso » [1845] : 4.
= *nomen nudum* à cette date. L'espèce a été décrite l'année suivante par Vérany, et Risso l'a étudiée et figurée plus tard : Risso 1854 : 59, pl. 28 (le texte indique : pl. 27, fig. 1). C'est un synonyme douteux de *Scaeurgus unicirrhus* Fér. et Orb., 1835-1848, Octopodidae.

† **columnius, Murex** 1826 : 197 (n° 510). « Moyennes profondeurs. Se trouve subfossile ».
Matériel type présumé perdu.

communis, Acanthochites 1826 : 269 (n° 714). « Sous les cailloux ».
= *Acanthochiton fascicularis* (L., 1767), Acanthochitonidae, très probablement, car Risso se réfère formellement à *Chiton fascicularis* in Poli 1792, vol. 2 : 10, pl. 4, fig. 3. Pour cette raison, on ne peut, en l'absence du matériel type, présumé perdu, considérer *A. communis* comme ayant priorité sur *A. aeneus* Risso [= *A. discrepans* (Brown, 1827)], comme l'a proposé Leloup (1941). Le nom *A. communis* doit donc cesser d'être utilisé, au profit d'*A. fascicularis*, le nom *A. aeneus* désignant une espèce différente.

(†) * **communis, Turritella** 1826 : 106 (n° 246); pl. 4, fig. 37; Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 40). « Régions des algues (...). Subfossile ».
= *Turritella communis* Risso, 1826, Turritellidae. Mais les 2 spécimens étiquetés *T. communis* dans la collection Risso du Muséum sont des *T. tricarinata* (Brocchi, 1814) mesurant 24 et 20 mm (Il y a eu échange de spécimens).

† **compressus, Nautilus** 1826 : 9 (n° 13); Ms : pl. XLI (ici : pl. 12, fig. 249). « Grès chlorité, Montalban » [= Mont Alban, Nice].
Matériel type présumé perdu.

† **computensis, Turritella** 1826 : 111 (n° 268); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 33). « Fossile aux environs de Contes ».
= Turritellidae. Matériel type présumé perdu.

† **consimilis, Pleurotoma** 1826 : 218 (n° 570); Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 198). « Fossile à Magnan et à la Trinité ».
= Turridae. Matériel type présumé perdu.

[conulus, Fusus 1826 : 207 (n° 535); Ms : pl. 48].
= C'est le *Murex conulus* Olivi, 1792, comme le suggère Risso lui-même par son renvoi « Olivi, p. 134, t. V, f. 1 » [= Olivi, 1792 : 134, pl. 5, fig. 1 : *Murex conulus*] = *Euthria cornea* (L., 1758), juv., Buccinulidae : 2 spec. de 37,5 et 36,5 mm dans la collection Risso, déjà signalés par Fischer-Piette et Beigbeder (1944), qui les considéraient à tort comme matériel type.

[corallina, Otavia « Risso » 1826 : 133 (n° 326), pl. 4, fig. 54; Ms : pl. 37 (sous *O. pharaonis corallina*)].
= C'est le *Clanculus corallinus* (Gm., 1790) dont la collection Risso possède 5 spécimens étiquetés « *Trochus corollina (sic)* et 5 autres étiquetés *T. corallina*. Risso avait d'ailleurs admis cette synonymie avec l'espèce de Gmelin en écrivant (Risso Ms 2052, systématique a, p. 169) » c'est le *Monodonta couturii* Payr., pl. 6, fig. 19-20 », l'espèce de Payraudeau étant en effet synonyme de *C. corallinus* (Gm., 1790).

corallinus, Lepidopleurus 1826 : 268 (n° 712). « Sur les rochers coralligènes ».
= *Chiton corallinus* (Risso, 1826), Chitonidae. Matériel type présumé perdu.

† **cordieria, Turritella** 1826 : 110 (n° 264); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 34). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

* * **cornea, Leachia** 1826 : 102 (n° 239), pl. 3, fig. 33. « Eaux saumâtres ».
= Comme le signalait déjà Caziot (1919) d'après l'examen des types de Risso, il s'agit d'*Hydrobia acuta* (Drap.). Actuellement, on trouve dans la collection Risso du Muséum 4 syntypes de *L. cornea* Risso, de 3,5-3,5-3 et 3 mm. Je désigne l'un des deux grands (Risso indique 4 mm dans sa diagnose de l'espèce) comme lectotype de *L. cornea* Risso, 1826.

[cornicula, Mitra « Risso » 1826 : 242 (n° 636)].
= C'est *Mitra (Mitra) cornicula* (L., 1758) que Risso annexe mais qu'il applique par erreur à une autre espèce : *Vexillum (Pusia) ebenus* (Lmk., 1811), Mitridae. 2 spécimens de 17 et 11 mm dans la collection Risso déjà révisés par Fischer-Piette et Beigbeder (1944) mais qui ne sont pas des types.

cornicula, Nassa : cf. corniculum, Buccinum.

(†) **corniculata, Purpura** 1826 : 168 (n° 432), pl. 7, fig. 88; Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 95). « Régions coralligènes (...) Subfossile ».
= *Mitrella scripta* (L., 1822), Pyrenidae, d'après la pl. Ms 32. Matériel type présumé perdu.

[corniculum, Buccinum « Risso » 1826 : 159 (n° 406); Ms : pl. 30].
= Risso a repris là le nom donné par Olivi, 1792, mais pour une toute autre espèce. Pour aggraver encore les choses, on trouve dans la collection Risso, étiquetées *Nassa cornicula* 5 coquilles de 19, 18, 16, 14 et 14 mm n'ayant de rapport ni avec l'espèce d'Olivi, ni avec celle décrite et figurée par Risso puisqu'il s'agit de 5 *Mitrella gervillei* (Payr., 1826). Espèce non retrouvée dans la collection Risso.

(†) **corona, Conus** 1826 : 229 (n° 600). « Se trouve subfossile ».
= Conidae. Matériel type présumé perdu.

† **coronatus, Murex** 1826 : 190 (n° 488), pl. 6, fig. 78; Ms : pl. 44 (ici : pl. 10, fig. 158). « Fossile à la Trinité ».
= *Murex brandaris* L., 1758, variété à un seul ordre d'épines. Voir notamment à ce sujet Caretto (1967). Matériel type présumé perdu.

[costata, Ranella « Risso » 1826 : 202 (n° 522); Ms : pl. 46].
= C'est, annexé par Risso *Ranella costata* (Born, 1793) qui est le *Cymatium (Monoplex) parthenopaeum* (von Salis, 1792), Cymatiidae d'après pl. Ms. 46.

(†) * * **costulata, Mangelia** 1826 : 219 (n° 572); Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 202). « Régions des algues (...). Subfossile ».
= *Bela nebula* (Montagu, 1808), Turridae. Dans la collection Risso du Muséum un spécimen de 7 mm, étiqueté *Mangelia curlutata* (sic) que je désigne comme lectotype de *M. costulata* Risso, 1826.

(†) **costulata, Mitra** 1826 : 246 (n° 649), pl. 5, fig. 66; Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 4). « Régions des algues (...). Subfossile ».
= (Non *Mitra costulata* Risso 1826 : 248) = *Vexillum (Pusia) ebenus* (Lmk., 1811); Mitridae. Matériel type présumé perdu. Ne pas confondre avec l'entrée suivante.

(†) **costulata, Mitra** 1826 : 248 (n° 657), pl. 10, fig. 140. « Subfossile ».
= préoccupé par *Mitra costulata* Risso, 1826 : 246, Mitridae. Matériel type présumé perdu.

(†) **costulata, Purpura** 1826 : 169 (n° 434); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 91). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= Turridae. Matériel type présumé perdu.

(†)** **costulata, Rissoa** 1826 : 119 (n° 283). Ms : pl. 14 (ici : pl. 8, fig. 50). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= (Non *Rissoa costulata* Alder, 1844; nec *Rissoa costata* Woods, 1842) = *Rissoa variabilis* (Megerle von Mühlfeld, 1824) : 6 syntypes de 9 à 7 mm. Je désigne le syntype de 9 mm comme lectotype de *R. costulata* Risso, 1826.

(†) * **costulata, Truncatella** 1826 : 125 (n° 301), pl. 4, fig. 57; Ms : 1 fig. 1 dans « figures diverses ». « Régions sablonneuses (...). Se trouve subfossiles (sic) ».
= *Truncatella subcylindrica* (L., 1766), Truncatellidae. 5 syntypes de 5 mm (Risso indique 6 mm dans sa diagnose) sont dans la collection Risso du Muséum.

† **costulata, Turbonilla** 1826 : 224 (n° 588), pl. 5, fig. 72; Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 205).
= (Non *Turbonilla costulata* Verrill, 1874) = *Turbonilla lactea* (L., 1776), Pyramidellidae, selon Monterosato (1884). Matériel type présumé perdu.

[costulatum, Cerithium « Risso » 1826 : 157 (n° 400); Ms : pl. 8].
= Il s'agit du *C. costulatum* da Costa, 1779, synonyme de *Bittium reticulatum* da Costa, qui est effectivement l'espèce l'espèce à laquelle appartiennent les 3 spécimens de la collection Risso (coquilles roulées de 11, 9 et 8 mm).

costulatus, Modiolus 1826 : 324 (n° 874), pl. 11; fig. 165; Ms : pl. 68 (ici : pl. 12, fig. 220). « Régions coralligènes ».
= *Musculus costulatus* (Risso, 1826), Mytilidae. Espèce qui a été reconnu par les auteurs mais dont le matériel type n'a pas été retrouvé.

(†) **costulatus, Murex** 1826 : 197 (n° 508); Ms : pl. 43 (ici : pl. 10, fig. 152). « Subfossile à Grosueil » [NW du Cap Ferrat].
= ? Cymatiidae. Matériel type présumé perdu.

(†)** **costulosa, Alvania** 1826 : 142 (n° 356), pl. 9, fig. 126; Ms : pl. 16 (ici : pl. 8, fig. 58). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Alvania lineata* Risso, 1826, Rissoidae, comme plusieurs auteurs l'avaient supposé. La collection Risso du Muséum contient un syntype roulé de 4 mm que je désigne comme lectotype, et une coquille usée d'*Alvania montagui* (Payr., 1826) dont il est impossible de dire si elle fait partie du lot type ou si elle y a été introduite secondairement.

(†) **costulosum, Buccinum** 1826 : 159 (n° 407); Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 84). « Subfossile ».
= (Non *Buccinum costulatum* Renier). Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

† * * **crassicostata, Alvania** 1826 : 143 (n° 357). « Régions des fucus (...). Se trouve fossile ».
= C'est *Alvania montagui* Payr., 1826, Rissoidae, nom sur lequel *A. discors Allan,* 1818 (cf. cette entrée) a priorité. Dans la collection Risso du Muséum, on trouve sous ce nom une coquille de 4 mm (longueur indiquée par Risso dans sa diagnose), que je désigne comme lectotype d'*Alvania crassicostata* Risso, 1826.

† **crassus, Pecten** 1826 : 300 (n° 799). « Fossile à Saint-Jean » [Cap Ferrat].
Matériel type présumé perdu.

CRENEA, 1826 : 83.
= (Non *Crenea* Albers, 1850 : *Trochoidea* T. Brown, 1827, Helicidae) ? *Caecilioides* Herrmannsen, 1846, Ferrussaciidae, la seule espèce décrite dans ce genre par Risso, *Crenea vitrea*, étant un *Caecilioides* juv.

* **crenulata, Clausilia** 1826 : 86 (n° 195). « Sous les pierres près des sources, à Brans, Brovis ».
= *Clausilia crenulata* Risso 1826, Clausiliidae, espèce reconnue valable par Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 3 syntypes dans la collection Risso, ayant des hauteurs de 11 à 12 mm. Bourguignat (1861, fig. 11-12) a figuré l'espèce d'après le matériel type de Risso.

† * * **crenulata, Venus** 1826 : 358 (n° 981); Ms : pl. 87. « Régions coralligènes (...). Se trouve fossile à la Trinité ».
= préoccupé par *V. crenulata* Chemn., 1792 et *V. crenulata* Solander (= *V. ovata* Penn., 1777). C'est en réalité *Astarte fusca* Poli, 1792, Astartidae, comme le suggèrent la diagnose et la figure de la pl. 87, et comme le

prouvent les deux valves conservées dans la collection Risso au Muséum : une valve droite de 15 mm (Risso indique 16 mm et figure une valve droite), que je désigne comme lectotype de *V. crenulata* Risso, 1826, et une valve gauche de 16 mm (Paralectotype).

curlutata (sic), Mangelia : cf. costulata, Mangelia.

* * **curvata, Ostrea** 1826 : 288 (n° 756), pl. 11, fig. 155; Ms : pl. 71 (ici : pl. 12, fig. 237 a) et 89. « Moyennes profondeurs ».
= *Ostrea stentina* Payr., 1826, Ostreidae. 2 syntypes dans la collection Risso du Muséum : une valve inférieure de 42 mm (celle signalée par Risso dans sa diagnose : je la désigne comme lectotype d'*O. curvata* Risso, 1826) et une valve supérieure de 35 mm.

(*) **cuvieri, Lemintina** 1826 : 114 (n° 275), pl. 2, fig. 16-18. « Sur les rochers peu profonds ».
= ? *Vermetus arenarius* (L., 1766), Vermetidae, plusieurs auteurs l'avaient supposé, mais, comme l'a montré Chavan (1944), non seulement les deux fragments de tubes de la collection Risso du Muséum étiquetés « *Vermetus cuvieri,* genus *Lemintina* » sont des tubes de Serpulidae, tandis que la diagnose et les figures de Risso traduisent un mélange de caractères de Vermetidae et de Serpulidae...

CYCLOPE, 1826 : 169.
= *Cyclope* Risso, 1826, Nassariidae. Ce genre a été placé sur l'Official list of generic names in Zoology, sous le numéro 1740 (Opinion 793. *Bull. zool. Nomencl.*, 23, n° 5 : 227, 1966), de façon à remplacer *Cyclops* Montfort, 1810, non Fabricius. Espèce type désignée par Keen (1964 : *Bull. zool. Nomencl.*, 23, n° 5 : 227) : *Cyclope neritoidea* Risso, 1826 = *Buccinum neriteum* L., 1767.

[cypria, Patella « Risso » 1826 : 265 (n° 704); 1824 : 358].
= C'est *Patella cypria* Gm., 1791 : *P. ferruginea* Gm., 1791.

† **dactylus, Belemnites** 1826 : 14 (n° 32). « Marne chloritée, Montalban » [Mont Alban = Nice].
Matériel type présumé perdu.

† **daubuissonius, Murex** 1826 : 199 (n° 514); Ms : pl. 47 (ici : pl. 10, fig. 163), sous *Ranella daubissonii.* « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

† **defrancia, Fissurella** 1826 : 258 (n° 684), pl. 10, fig. 139; Ms : pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 16), sous *F. defrancii.* « Fossile à la Trinité ».
= *Diodora italica* (Defrance, 1820), Fissurellidae, que Risso a rebaptisé abusivement *F. defrancia !* Matériel type présumé perdu.

deltoidea, Nucula : cf. deltoideus, Lembulus.

[deltoideus, Lembulus « Risso » 1826 : 320 (n° 865), pl. 11, fig. 164; Ms : pl. 69 (sous *Nucula deltoidea*)].
= C'est le *Nucula deltoidea* Lmk., fossile de Grignan, dont Risso annexe le nom = ? *Nuculana fragilis* (Chemn., 1784), Nuculanidae.

(†) **delucianus, Strombus** 1826 : 227 (n° 594), pl. 7, fig. 86; Ms : pl. 3 (ici : pl. 8, fig. 3). « Subfossile à Grosueil » [NW du Cap Ferrat].
= *Strombus bubonius* Lmk., 1766, Strombidae. Matériel type présumé perdu.

† **denticulatum, Solarium** 1826 : 139 (n° 346); Ms : pl. 38 (ici : pl. 9, fig. 132). « Fossile à Saint Jean et à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

† **depressa, Ampularia** 1826 : 152 (n° 385). « Fossile à Contes ».
Matériel type présumé perdu.

* **depressa, Emarginula** 1826 : 259 (n° 689), pl. 10, fig. 151; Ms : pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 20 b). « Régions madréporiques ».
= *Emarginula huzardi* Payr., 1826, Fissurellidae. L'unique coquille (8 mm) de la collection Risso du Muséum n'est pas le spécimen dont il donne la dimension (12 mm) : c'est une *E. huzardi,* juv. (avec laquelle on trouve une coquille égarée de *Gadinia garnoti*).

depresa, Gibbula Risso Ms *in schedulis, fide* Blainville (Faune de France, p. 285).
= *Gibbula varia* (L., 1766), Trochidae, selon Blainville. Aucun spécimen étiqueté *Gibbula depressa* n'existe actuellement dans la collection Risso.

† **depressus, Solen** 1826 : 375 (n° 1031); Ms : pl. 83 (ici : pl. 12, fig. 247). « Fossile dans l'argile chloritée » [du Mont Chauve, plusieurs fois citée par Risso ?].
Matériel type présumé perdu.

† **deshayesi, Dentalium** 1826 : 400; Ms : pl. 56 (ici : pl. 10, fig. 169). « Fossile à la Trinité et à Saint-Jean ».
Matériel type présumé perdu.

desmaresti, Planaxis : cf. desmarestiana, Planaxis

desmarestiana, Nassa : cf. desmarestiana, Planaxis.

† * * **desmarestiana, Planaxis** 1826 : 176 (n° 452), pl. 8, fig. 105; Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 101) sous *P. desmaresti.* « Profondeurs coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Hinia incrassata* (Müller, 1774), Nassariidae. L'unique spécimen de la collection Risso du Muséum (que je désigne comme lectotype de *P. desmarestiana* Risso, 1826) est une coquille de 10,5 mm étiquetée *Nassa desmarestiana,* déjà révisée par Fischer-Piette et Beigbeder (1944).

* * **desserea, Gibbula** 1826 : 136 (n° 336). « Régions des algues ».
= *Gibbula umbilicaris* (L., 1766), Trochidae. 2 syntypes (étiquetés *Trochus desserea*) de 12 et 11 mm dans la collection Risso du Museum : je désigne le spécimen de 12 mm comme lectotype de *G. desserea* Risso, 1826. Une coquille de *Clanculus cruciatus* (L., 1766) est jointe par erreur aux 2 syntypes.

desserea, Trochus : cf. desserea, Gibbula.

dicquemari, Tergipes 1818 : 373. « Sous les galets ».
= Espèce invalidée sous le n° 860 : opinion 773. *Bull. Soc. zool. Nomencl.*, 23 : 84, 1966. Matériel type non retrouvé, ce qui serait d'ailleurs d'un intérêt limité par suite de la décision précitée.

[discors, Alvania « Risso » 1826 : 145 (n° 364); Ms : pl. 16].
= C'est le *Turbo discors* Allan, 1818 : 463 (tiré à part : 37), pl. 10, fig. 5. Rissoidae annexé par Risso ! La comparaison des figures ne laisse aucun doute à ce sujet. Dans la collection Risso, on trouve sous le nom d'*A. discors* une coquille de 4 mm qui est un *Alvania montagui* Payr., 1826. L'espèce d'Allan devrait donc avoir priorité sur celle de Payraudeau (voir aussi entrée *discrepans, Alvania*).

discors, Buccinum 1826 : 159 (n° 405); Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 78). « Régions coralligènes ».
= Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

(†) **discors, Bullina** 1826 : 52 (n° 114). « Fossile à Magnan et à Saint-Jean ».
= *Cylichna convoluta* (Brocchi 1814), espèce à laquelle Risso se réfère formellement (« Broc., 277, 6, 1, 7 a-b » = Brocchi 1814 : 277, n °6, pl. 1, fig. 7 a-b) et dont *Bullina discors* n'est donc qu'un synonyme postérieur. Matériel type présumé perdu.

(†) **discors, Gibbula** 1826 : 138 (n° 341); Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 144). « Fossile à la Trinité, à Saint-Philippe ».
= Trochidae. Matériel type présumé perdu.

[discrepans, Alvania « Risso » 1826 : 140 (n° 350)].
= C'est le *Turbo discrepans* Allan, 1818 : 463 (tiré à part : 37), pl. 10, fig. 4, annexé par Risso ! La collection Risso contient 2 spécimens de cette espèce mesurant 5 et 4 mm qui sont des *Alvania montagui* Payr., 1826 (Risso, Ms 2052 du Museum, Systématique a, p. 162 indique d'ailleurs cette synonymie). *Alvania discrepans* Allan, 1818 a donc priorité sur *Alvania montagui* Payr., 1826, mais, comme signalé plus haut (voir entrée *discors, Alvania*), *Alvania discors* (Allan, 1818, lui-même synonyme d'*A. montagui,* a priorité de page sur *A. discrepans* (Allan, 1818) !

† **discrepans, Planaxis** 1826 : 178 (n° 460), pl. 7, fig. 89; Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 110). « Fossile à Magnan et à la Trinité ».
= ? *Amycla* sp., Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

donatiana, Nassa : cf. donatiana, Planaxis.

(†) * * **donatiana, Planaxis** 1826 : 176 (n° 451); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 106), sous *P. donatii*). « Régions coralligènes » (...) Se trouve subfossile ».
= *Hinia costulata* (Renier, 1804) = *Nassa cuvieri* Payr., 1826, Nassariidae, comme l'ont déjà signalé Fischer-Piette et Beigbeder (1944); l'unique spécimen de la collection Risso du Muséum, étiqueté *Nassa donatiana,* mesure 13 mm (Risso indique 14 mm dans la diagnose) et correspond à la figure de la pl. Ms 32 : je le désigne comme lectotype de *Planaxis donatiana* Risso, 1826 (il ne s'agit pas d'un holotype, contrairement à ce qu'indiquent les deux auteurs précités).

donatii, Planaxis : cf. donatiana, Planaxis.

donavania (sic), **Cyclope** 1826 : 271, (n° 718), pl. 4, fig. 56; Ms : pl. 22 (ici : pl. 9, fig. 65) sous *Eione donovania.* « Régions coralligènes ».
= *Cyclope donovani* Risso, 1826, Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

donavania (sic), Eione : cf. donavania (sic), Cyclope.

(†) **dufresnei, Alvania** 1826 : 143 (n° 359); Ms : pl. 16 (ici : pl. 8, fig. 56). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= Rissoidae. Matériel type présumé perdu.

(†) * **dumerili, Trochus** 1826 : 129 (n° 315); Ms : pl. 35 (ici : pl. 9, fig. 121). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Calliostoma exasperata* Penn. 1777, Trochidae. 2 syntypes de 11 et 10 mm de hauteur, dans la collection Risso du Muséum.

DUVAUCELIA (Leach Ms) Risso 1826 : 38 (et non 1818).
= *Duvaucelia* (Leach Ms) Risso, 1826, Tritoniidae. Type (par monotypie) : *D. gracilis* Risso, 1826.

eburnea, Acicula 1826 : 81. « Fossés des prairies ».
= *Cecilioides eburnea* Risso, 1826, Ferrussaciidae, selon Germain (1913). Matériel type présumé perdu.

(†) **eburnea, Niso** 1826 : 219 (n° 571), pl. 7, fig. 98; Ms : pl. 53 (ici : pl. 11, fig. 211). « Fossile à la Trinité ».
= *Niso eburnea* Risso, 1826, Eulimidae : espèce type du genre *Niso* Risso, 1826. Matériel type présumé perdu.

EIDOTHEA, Risso, 1826 : 46.
= *Aglaja* Renier, 1804, Aglajidae. Type (par monotypie) : *E. marmorata* Risso, 1826 = *Aglaja depicta* Renier, 1804.

EIONE, 1826 : 171.
= *Sphaeronassa* Locard, 1884 (pro parte), Nassariidae.

[elegans, Buccinum « Risso » 1826 : 163 (n° 417); Ms : pl. 30].
= C'est probablement *B. elegans* Brocchi 1814 (non Costa). Cette espèce n'est pas représentée dans la collection Risso du Muséum.

* * **elegans, Rissoa** 1826 : 119 (n° 285), pl. 4, fig. 46; Ms : pl. 14 (ici : pl. 8, fig. 49). « Sables du Lazaret ».
= Risso a fait un curieux mélange entre deux espèces. 1°) *Rissoa auriscalpium* (L., 1766), Rissoidae, qui est décrite, figurée par la pl. Ms 14 (mais non par la fig. 46), et représentée dans la collection Risso du Muséum par une coquille de 7 mm (qui n'est pas le spécimen dont Risso donne la longueur : 12 mm). Je la désigne cependant comme lectotype de *R. elegans* Risso, 1826.
2°) *Melaraphe neritoides* (L., 1767), Littorinidae, qui est clairement figurée par la pl. 4, fig. 46, par suite d'un lapsus évident (mais pas par la pl. Ms 14 comme cela vient d'être dit).

† **elegans, Scalaria** 1826 : 113 (n° 274), pl. 4, fig. 49; Ms : pl. 12 (ici : pl. 1, fig. 32). « Fossile tertiaire à Saint-Jean ».
Matériel type présumé perdu.

elegans, Sepiola 1845 : 4 (*nomen nudum* à cette date); 1854 : 10, pl. 6, fig. 2 (le texte indique : pl. 1, fig. 2); Ms : pl. XXXIV (= pl. 6, fig. 2 de Risso 1854). « Régions sablonneuses ».
= ?? *Sepietta neglecta* Naeff, 1916, Sepiolidae, selon Adam (1942). Aurait priorité si cette similitude était prouvée. Matériel type présumé perdu.

* **elegans, Succinea** 1826 : 59 (n° 128). « Plantes de nos fossés ».
= Cette espèce a été proposée pour addition à l'Official List (*Bull. zool. Nomencl.*, 2 : 126, 1958). Bourguignat (1861) considérait l'espèce bonne mais signalait que dans la collection Risso elle était mêlée à quelques spécimens de *S. ochracea* De Betta. Actuellement la collection Risso du Muséum contient 3 syntypes (dont 2 plus ou moins brisés) mesurant 11 à 12 mm de hauteur. Plusieurs auteurs ont vu dans l'espèce de Risso une variété de *S. putris* L., 1758, Succineidae.

elegantissima, Eulima 1826 : 123 (n° 296). « Régions sablonneuses ».
= ? *Eulima polita* (L., 1766), Eulimidae. Matériel type présumé perdu.

† **elegantissimum, Buccinum** 1826 : 165 (n° 424), pl. 7, fig. 92; Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 80). « Fossile à Saint Jean, à Magnan ».
= Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

(†) **elfordiana, Planaxis** 1826 : 177 (n° 457). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

[elongata, Pandora « Risso » 1826 : 373 (n° 1026); Ms : pl. 83].
= Risso cite en référence « All. 33, 1; IX, 2 » [= Allan 1818 : 459 (tiré à part : 33), n° 1, pl. 9, fig. 2], c'est à dire *Mya elongata* Brocchi, 1814. D'après la référence d'Allan, la planche de Risso, et la révision du type de Brocchi par Risso-Ronchetti (1955), il s'agit de *Hiatella arctica* (L. 1767).

ELYSIA, 1826 : 45 (et non 1812).
= *Elysia* Risso, 1826, Plakobranchidae Gray, 1840 (= Elysiidae H. & A. Adams, 1854).

ERATO, 1826 : 240.
= *Erato* Risso, 1826, Triviidae. Type *Voluta cypraeola* Brocchi, 1814.

(*) **eristalius, Vediantius** 1826 : 82 (n° 183), pl. 3, fig. 24. « Fissures des rochers du Lazaret ».
= *Ferrussacia* (sic) *gronoviana* Risso, 1826, Ferrussaciidae. Seule l'étiquette existe dans la collection Risso du Muséum : le matériel type est présumé perdu.

ETHALION, 1826 : 36.
= Genre d'Aeolidiidae inscrit (n° 1796) dans l'Official Index of rejected or invalid generic names in zoology (Opinion 774. *Bull. zool. Nomencl.*, 23, n° 2-3 : 87, 1966), de même que son émendation invalide *Aethalion* Herrmannsen, 1846 (n° 1797), sur proposition de H. Lemche (1964 : *Bull. zool. nomencl.*, **21**, n° 1 : 40-43). Son type (par monotypie) est *E. histrix* Otto, 1821.

† **eugenia, Ostrea** 1826 : 289 (n° 760)); Ms : pl. 72 (ici : pl. 11, fig. 214). « Fossile à Saint-Jean [Cap Ferrat] et à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

EULIMA, 1826 : 123.
= *Eulima* Risso, 1826, Eulimidae. Type *E. polita* (L., 1176).

euphrosina, Lolidona 1854 : 33, pl. 17, fig. 1, pl. 18, fig. 1-2 (le texte indique : pl. 14-15); Ms : pl. XVII-XVIII (=pl. 17, fig. 1 et pl. 18, fig. 1-2 de Risso, 1854). « Grandes profondeurs ».
= *Histioteuthis bonelliana* Fér., 1834, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

(†) * * **europea, Alvania** 1826 :142 (n° 354), pl. 9, fig. 116; Ms : pl. 16 (ici : pl. 8, fig. 54). « Régions des fucus » (...). Se trouve subfossile ».
= *Alvania (Turbona) cimex* (L., 1767), Rissoidae comme l'ont admis divers auteurs. La collection Risso du Muséum contient 4 syntypes plus ou moins roulés de 5 à 4 mm. Je désigne un spécimen de 4 mm (dimension indiquée dans la diagnose de Risso) comme lectotype d'*Alvania europea* Risso, 1826.

[europea, Cypraea « Risso » 1826 : 239 (n° 628); Ms : pl. 33].
= C'est *Cypraea europaea* Montagu, 1808, Triviidae, annexé par Risso ! Sa collection, au Muséum contient 5 spécimens de ce *Trivia europaea* (Montagu, 1808), Triviidae variété *tripunctata,* mesurant de 8 à 10 mm.

* **fasciata, Helicella** 1826 : 72 (n° 158). « Montagne d'Agel ».
= *Xerophila cespitum* (Drap., 1801), Helicidae, selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. Actuellement on trouve dans la collection Risso sous *Helix* (sic) *fasciata* un type possible qui est un *Helicella (Xeromagna)* sp. (selon Chevallier, 1976).

fasciata, Helix : cf. *fasciata, Helicella.*

fasciata, Nacca 1826 : 149 (n° 377); Ms : pl. 29 (ici : pl. 9, fig. 72). « Grandes profondeurs ».
= *Natica millepunctata* Lmk., 1822, Naticidae, d'après la pl. Ms 29. Matériel type présumé perdu.

(†) * * **fasciatus, Murex** 1826 : 193 (n° 496); Ms : pl. pl. 43 (ici : pl. 10, fig. 160 a). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Murex trunculus* (L., 1758) juv., Muricidae, comme le signalent Fischer-Piette et Beigbeder (1943), représenté dans la collection Risso du Muséum par 2 syntypes de 26 et 22 mm. Le premier étant celui de la pl. Ms. 43, je le désigne comme lectotype de *M. fasciatus* Risso, 1826.

† * **favaniana, Patella** 1826 : 266 (n° 707). « Se trouve fossile à la Trinité ».
= *Patella caerulea* L., 1758, Patellidae. 2 syntypes de 40 × 32 × 13 mm et 33 × 29 × 12 mm sont dans la collection Risso du Muséum. Ne correspondent pas aux dimensions citées par Risso.

† **favanne, Cerithium** 1826 : 156 (n° 395). « Fossile à la Trinité et à Saint-Philippe ».
= Matériel type présumé perdu.

* **ferruginea, Helicella,** 1826 : 72 (n° 159). « Nos environs » [= région de Nice].
= *Caracollina lenticula* (Fér., 1821), Helicidae, selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 4 syntypes dans la collection Risso du Muséum.

(†) * * **ferruginosa, Alvania** 1826 : 141 (n° 352). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= La collection Risso du Muséum contient, sous ce nom, une coquille de 3 mm, que je désigne comme lectotype d'*A. ferruginosa* Risso, 1826, et qui est un *Alvania discors* (Allan, 1818), Rissoidae ayant priorité sur *Alvania montagui* Payr., 1826 (cf. entrée *discors, Alvania*) et une coquille de 6 mm de *Rissoa violacea* Desm., 1814, résultant d'un mélange.

FERRUSSACIA 1826 : 80.
= *Ferrussacia* Risso, 1826, Ferrussaciidae (= *Ferussacia* Bourguignat, 1846 : émendation invalide). Génotype : *F. gronoviana* Risso, 1826.

ferussaci, Oris 1826 : 57 (n° 125). « Moyennes profondeurs vaseuses ».
= Onchidiidae indét., selon Bourguignat (1861). Matériel type présumé perdu.

FIDELIS 1826 : 121, et **FIDELA** 1826 : 135.
= *Truncatella* Risso, 1826, juv., Truncatellidae. Genre inscrit à l'Official Index of rejected and invalid generic names in zoology (Nos. 244-245).

* * **fistulatus, Murex** 1826 : 191 (n° 491); Ms : pl. 43 (ici : pl. 10, fig. 162). « Grandes profondeurs coralligènes ».
= A priorité sur *Typhis (Typhinellus) sowerbyi* Brod., 1833 (syn : *T. tetrapterus* Bronn), Muricidae. Dans la collection Risso du Muséum, on trouve sous ce nom une coquille de 16 mm à tubes remarquablement longs, correspondant bien à la pl. Ms 43 (Fischer-Piette et Beigbeder, 1943). Ce spécimen étant marqué abusivement paratype, je le désigne ici comme lectotype de *M. fistulatus* Risso, 1826. A noter que le nom de *M. fistulatus* est évidemment une déformation de celui de *M.* **fistulosus** Brochi, 1814 que Rossi-Ronchetti considère comme une bonne espèce devant être appelée *Typhis (Cyphonochelus) fistulosus* (Brochi, 1814).

fitcheliana, Nassa = cf. fitcheliana, Planaxis.

(†)** **fitcheliana, Planaxis** 1826 : 177 (n° 455), pl. 9, fig. 127; Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 107) sous *P. filcheliana.* « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Hinia costulata* (Renier, 1804) = *Nassa cuvieri* Payr., 1826, Nassariidae, comme le signalaient déjà Fischer-Piette et Beigbeder (1944); la collection Risso du Muséum contient deux syntypes étiquetés « *Nassa fitcheliana* », l'un de 8 mm, que les auteurs précités qualifiaient d'holotype, mais que je désigne comme lectotype de *Planaxis fitcheliana* Risso, 1826, et une coquille (paralectotype) de 7 mm.

† * * **flaminea, Mitrella** 1826 : 248 (n° 655), pl. 10, fig. 144. « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Mitrella scripta* (L., 1767), Pyrenidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944); la collection Risso du Muséum contient 2 syntypes de 13 mm (Risso indique 12 mm dans sa diagnose). Je désigne l'une d'eux comme lectotype de *M. flaminea* Risso, 1826.

flavescens, Eolidia 1826 : 38 (n° 90). « Sur les ulves et fucus ». (Non *Eolis flavescens* Friele, 1876).
= ? *Eubranchus farrani* Alder et Hancock, 1844, Eubranchidae (= *Galvina flava* Trinchese, 1879) selon Pruvot-Fol (1936b). A noter que même si cette identité d'*E. flavescens* avec *E. farrani* venait à être prouvée (ce qui est peu vraisemblable, le matériel type d'*E. flavescens* étant présumé perdu) l'espèce de Risso n'aurait pas priorité : *Eubranchus farrani* a été inscrit sur la liste officielle (Opinion 774. *Bull. zool. Nomencl.*, 23 : 87, 1966).

† **flexuosa, Ammonites** 1826 : 12 (n° 27); Ms : pl. LVIII (ici : pl. 12, fig. 260). « Grès chloritè, Place Victor » [à Nice].
Matériel type présumé perdu.

* **folliculata, Hygromia** 1826 : 67 (n° 145). « Vallons et lieux ombragés ».
= *Ciliella ciliata* (Venetz *in* Studer 1820, Helicidae, Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 4 syntypes dans la collection Risso du Muséum, étiquetés *Helix poligulata* (sic) et mesurant 6 à 7 mm de hauteur.

(†) * * **fortis, Murex** 1826 : 195 (n° 504), pl. 7, fig. 100; Ms : pl. 43 (ici : pl. 10, fig. 159). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Fusinus syracusanus* (L., 1758), Fasciolariidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944). Un spécimen dans la collection Risso du Muséum, mesurant 21 mm et qui est celui de la pl. Ms 43 (et peut être celui de la fig. 100, très idéalisée ?) : je le désigne comme lectotype de *M. fortis* Risso, 1826.

fragilis, Abra 1826 : 370 (n° 1018). « Régions madréporiques ».
= *Abra prismatica* (Laskey, 1803), Scrobiculariidae. Matériel type présumé perdu.

** **fragilis, Fusus** 1826 : 206 (n° 534), pl. 6, fig. 75; Ms : pl. 48 (ici : pl. 10, fig. 171). « Régions coralligènes ».
= *Aporrhais pespelecani* (L., 1758), Aporrhaidae : la collection Risso du Muséum contient une coquille à laquelle manque le dernier tour et que je désigne ici comme lectotype de *F. fragilis* Risso, 1826.

(†) * * **freminvillea, Alvania** 1826 : 141 (n° 353), pl. 9, fig. 118; Ms : pl. 16 (ici : pl. 8, fig. 57). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Alvania (Turbona) cimex* (L., 1767), Rissoidae. 4 syntypes plus ou moins usés, de 5 à 6 mm et à fascies faiblement marquées sont dans la collection Risso du Muséum : je désigne un spécimen de 6 mm comme lectotype d'*Alvania freminvillea* Risso, 1826.

fulminea, Ancillaria 1826 : 231 (n° 607), pl. 5, fig. 71; Ms : pl. 34 (ici : pl. 11, fig. 209). « Régions coralligènes ».
Matériel type présumé perdu.

fulminea, Capsa 1826 : 351 (n° 956). « Baies et lieux abrités ».
Matériel type présumé perdu.

[fulminea, Nacca « Risso » 1826 : 149 (n° 376); Ms : pl. 29].
= C'est *Natica fulminea* (Gm., 1790), Naticidae que Risso a changée de genre, comme il le suggère lui-même en citant Gmelin et Adanson. Le matériel type n'ayant pas été retrouvé, on ignore s'il a cru trouver cette espèce du Sénégal en Méditerranée par suite d'un mélange d'étiquettes, ou si c'est une autre espèce (? *Natica flammulata* Requien, 1848) qu'il a ainsi identifiée par erreur.

fulva, Arctoe 1826 : 361 (n° 992), pl. 11, fig. 163; Ms : pl. 87 (ici : pl. 12, fig. 243). « Régions algues ».
= *Dosinia exoleta* (L., 1758), Veneridae. Matériel type présumé perdu.

* **fulva, Venus** 1826 : 357 (n° 974); Ms : pl. 87 (ici : pl. 12, fig. 238). « Régions des algues ».
= *Dosinia lupinus* (L., 1758), Veneridae. Une valve (syntype) dans la collection Risso du Muséum, qui n'est pas la valve mesurée par Risso puisqu'elle mesure 22 mm sur 22 mm.

fusus, Loligo 1845 : 4 *(nomen nudum* à cette date); 1854 : 19, pl. 8 fig. 1-2; Ms : pl. VII (= pl. 8 de Risso 1854). « Moyennes profondeurs ».
= ? *Loligo forbesi* Steenstrup, 1856, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

† **georgina, Turritella** 1826 : 111 (n° 267); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 36). « Fossile à Magnan ».
= Turritellidae. Matériel type présumé perdu.

† **gibba, Cassis** 1826 (n° 468); Ms : pl. 55 (ici : pl. 11, fig. 187). « Fossile à Magnan ».
= Cassididae. Matériel type présumé perdu.

gibbosa, Tritonia 1818 : 371; 1826 : 35 (n° 85). « Parmi les coralines » (ce qui est sans rapport avec « Régions coralligènes » qu'indique Risso, 1826 ! C'est évidemment là un lapsus dû à la similitude des racines de ces deux mots).
= *Ancula gibbosa* (Risso, 1818), Goniodoridae, selon Pruvot-Fol (1936a, 1954). Bonne espèce dont le matériel type est présumé perdu.

[gibbosula, Eione « Risso », 1826 : 171 (n° 438), pl. 4, fig. 50; Ms : pl. 22].
= C'est *Sphaeronassa gibbosula* (L., 1758), Nassariidae, que Risso assigne à son nouveau genre *Eione*.

GIBBULA (Leach Ms) Risso 1826 : 134.
= *Gibbula* (Leach Ms) Risso, 1826 = *Gibbula* Leach, 1852 Trochidae. Type : *Trochus magus* L., 1766 (désigné par Herrmannsen 1847).

giganteus, Scaphander 1826 : 51 (n° 109), pl. 2, fig. 12; Ms : 1 fig. dans « Figures diverses ». « Profondeurs vaseuses ».
= *Scaphander lignarius* (L., 1758), Scaphandridae, comme l'ont admis déjà de nombreux auteurs. L'espèce de Risso est basée sur un spécimen de très grande taille (68 mm), qui n'a pas été retrouvé.

† * * **ginnania, Mangelia** 1826 : 220 (n° 575), pl. 7, fig. 99; Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 201 a) sous *M. ginnanii*. « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Haedropleura septangularis* (Montagu, 1803), Turridae. Une coquille de 10 mm, dans la collection Risso du Muséum, coquille que je désigne comme lectotype de *M. ginnania* Risso, 1826. Or les auteurs ont généralement admis comme valable l'espèce de Risso, en la considérant soit comme une bonne espèce de *Mangelia* (ou de *Bela*) soit comme une variété de *Bela nebula*. Puisqu'il n'en est rien, ce *Mangelia ginnania* Auct. (non Risso) doit prendre le nom de *Mangelia fuscata* Desh., 1837 (Exp. sci. Morée, 3, Moll. : 117) qui semble être le premier nom disponible pour lui.

(†) * * **glaber, Fusus** 1826 : 207 (n° 536), pl. 9, fig. 129. « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Mitrella scripta* (L., 1767), Pyrenidae. L'unique spécimen de la collection Risso du Muséum a le dernier tour brisé et mesure 11 mm. Il correspond bien à la dimension indiquée par Risso, et je le désigne comme lectotype de *F. glaber* Risso, 1826.

(†) **glaberrima, Eulima** 1826 : 124 (n° 297); Ms : pl. 17 (ici : pl. 8, fig. 63). « Régions sablonneuses (...). Se trouve subfossile ».
= Risso donne en référence « Allan, p. 37, t. 10, f. 2 qui correspond au *Turbo glaber* Allan, 1818. Risso a donc donné abusivement à l'espèce d'Allan ce nouveau nom de *glaberrima ! Turbo glaber* et *Eulima glaberrima* sont probablement deux synonymes d'*Eulima polita* (L., 1776), Eulimidae. Le matériel de Risso est présumé perdu.

* * **glabra, Mitra** 1826 : 241 (n° 633); Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 7). « Régions des algues ».
= (Non Swainson, 1821, nec Pease 1868) = *Mitra (Mitra) cornicula* (L., 1758), Mitridae, comme l'ont reconnu Fischer-Piette et Beigbeder (1944) : 2 syntypes de 19,5 et 18 mm sont dans la collection Risso du Muséum. Le second syntype peut être celui dont Risso indique la longueur (17 mm) et je le désigne comme lectotype de *M. glabra* Risso, 1826.

glabra, Purpura 1826 : 169 (n° 435); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 93). « Subfossile ».
= Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

glabra, Siliquaria 1826 : 115 (n° 276). « Régions coralligènes profondes ». Matériel type présumé perdu.

(†) **glabra, Turbinella** 1826 : 213 (n° 553), pl. 8, fig. 112; Ms : pl. 53 (ici : pl. 11, fig. 210). « Fossile à la Trinité ».
= Mitridae. Matériel type présumé perdu.

[glaucina, Natica « Risso » 1826 : 147 (n° 371); Ms : pl. 24 (3 figures)].
= C'est *Natica glaucina* Gm., 1790, Naticidae, qui est synonyme de *Polynices catena* (Da Costa, 1778).

gracilis, Duvaucelia 1826 : 38. « Région des algues ».
= *Duvaucelia gracilis* Risso, 1826 (et non 1818 comme l'écrit Pruvot-Fol 1936a, 1954),

Tritoniidae. C'est l'espèce type (par monotypie) du genre *Duvaucelia* Risso 1826. Matériel type présumé perdu.

* * **granulata, Nesaea** 1826 : 223 (n° 585), pl. 5, fig. 67; Ms : pl. 48 (ici : pl. 10, fig. 177). « Région des algues ».
= *Chauvetia minima* (Montagu, 1808), Buccinidae. L'unique spécimen de la collection Risso du Museum mesure 6 mm et est peut être celui mesuré par Risso : je le désigne comme lectotype de *N. granulata* Risso, 1826.

[granulosum, Cerithium « Risso » 1826 : 157 (n° 398); Ms : pl. 8].
= C'est le *Murex granulosus* Brocchi, 1814, annexé par Risso. Dans la collection Risso, on trouve sous *C. granulosum* 3 coquilles de *Bittium reticulatum* (Da Costa, 1779) Cerithiidae, plus on moins usées, de 14 et 10 mm, et 2 *Triphora perversa* (L., 1758), Triphoridae, brisées de 11 et 9 mm (c'est l'une d'elles qui est figurée par la pl. Ms 8) !

* * **grenophia, Arca** 1826 : 313 (n° 840); Ms : pl. 68 (ici : pl. 12, fig. 225). « Régions coralligènes ».
= La collection Risso du Muséum contient, sous ce nom, une valve droite mesurant 6,5 × 5 mm (Risso indique 6 mm dans sa diagnose) que je désigne comme lectotype d'*A. grenophia* Risso, 1826. Elle montre que l'espèce de Risso est un *Bathyarca* ayant priorité sur *B. pectunculoides* (Scacchi, 1833).

* **grisea, Patella** 1826 : 262 (n° 696). « Sur les rochers du littoral ».
= (Non *Patella grisea* Gm., 1791 = Siphonariidae; nec *Patella grisea* Röding, 1798 = Fissurellidae). = *Patella caerulea* L., 1758, Patellidae, selon Christiaens (1974a). 2 syntypes dans la collection de Risso du Muséum, mesurant 43 × 39 × 11 mm et 42 × 35 × 9 mm. Ils ne correspondent pas à la dimension indiquée par Risso.

griseus, Busiris 1826 : 34 (n° 83), pl. 1, fig. 6. « Profondeurs coralligènes ». Espèce type du genre *Busirus* Risso, 1826 (par monotypie).
= *Notarchus griseus* (Risso, 1826), Aplysiidae dont le nom a priorité sur celui de *N. punctatus* Phil., 1836. Matériel type présumé perdu.

gronoviana, Ferrussacia (sic) 1826 : 80 (n° 180), pl. 3, fig. 27. « Fissures des rochers du Lazaret ».
= *Ferrussacia* (sic) *gronoviana* Risso, 1826, Ferrussaciidae. Espèce type du genre *Ferrussacia*. Matériel type présumé perdu, mais qui a été illustré par Bourguignat (1861 : fig. 8-10).

† **gryphoides, Ostrea** 1826 : 290 (n° 763); Ms : pl. 72 (ici : pl. 11, fig. 213). « Fossile au Lazaret ».
Matériel type présumé perdu.

(†) * * **gualteriana** (sic), **Columbella** 1826 : 206 (n° 533). « Région des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Pyrene rustica* L. (1766), Pyrenidae. 2 syntypes de 18 et 17 mm dans la collection Risso du Museum. Fischer - Piette et Beigbeder (1944), auxquels on doit la première révision de l'espèce, ont qualifié le spécimen de 18 mm d'« holotype ». Mais je le désigne, en conformité avec le Code, comme lectotype de *C. gualtieriana* Risso, 1826.

guilfordia, Columbella 1826 : 205 (n° 531), pl. 7, fig. 87. Aucune indication de provenance.
= *Pyrene rustica* (L., 1767), Pyrenidae. Matériel type présumé perdu.

guttata, Doris 1826 : 33 (n° 80). « Sous les cailloux ».
= Selon Pruvot-Fol (1954), c'est une bonne espèce, de *Dendrodoris* (Dendrodoridae) ayant pour synonyme *D. grandiflora* (Rapp, 1827) : ce *Dendrodoris guttata* (Risso, 1826), Dendrodorididae, devrait avoir priorité sur l'espèce de Rapp, mais cela semble difficilement applicable dans la mesure où le nom *D. grandiflora* est très connu et employé. Matériel type présumé perdu.

(†) * * **gyrinata, Ranella** 1826 : 203 (n° 525) [Non pl. 8, fig., 115] Ms : pl. 46 (ici : pl. 10, fig. 166). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= (Non *Murex gyrinoides* Brocchi, 1814) = *Cymatium tuberosum* (Lmk., 1822), Cymatiidae de l'Indo-Pacifique, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1943) dans leur révision des Gastropodes du Muséum national d'Histoire naturelle : dans la collection Risso du Muséum, on trouve un unique syntype de 31 mm (Risso indique 34 mm dans sa diagnose), que je désigne comme lectotype de *R. gyrinata* Risso, 1826. Selon Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus (1882) la fig. 115 de Risso représente une autre espèce, *C. pileare* (Lmk, 1822).

† **haania, Turrilites** 1826 : 13 (n° 30); Ms : pl. XCI (ici : pl. 12, fig. 263), sous *T. haani*. « Calcaire secondaire, Alpes-Maritimes ».
Matériel type présumé perdu.

HALIA 1826 : 52.
= *Ampulla* Röding, 1798, Volutidae. Type : *Ampulla priamus* Röding, 1798, désigné par Pilsbry (1908, *Nautilus,* 22 : 83) (cf. *Bull. zool. Nomencl.,* 27 (1) : 41-43, 1970). Voir aussi Dall (1898).

hamatus, Onychoteuthis 1845 : 4 (*Onychotretis,* sic) (*nomen nudum* à cette date); 1854 : 35, pl. 13, fig. 1-2 (le texte indique pl. 16); Ms : pl. XIII (= pl. 13 de Risso 1854). « Régions des galets ».
= *Ancistroteuthis lichtensteinii* Fér. et Orb. 1835-1848, Onychoteuthidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

[HELICIGONA « Risso » 1826 : 66].
= *Helicigona* Fér., 1819, Helicidae. Génotype : *Helix lapicida* L., désigné par Pilsbry (1895). Genre attribué par erreur à Risso (au lieu de Férussac) par Zilch (1960 : Gastropoda, Teil 2. Euthyneura) : 703.

[helicoides, Halia 1826; 52 (n° 115), pl. 6, fig. 79; Ms : pl. 23].
= C'est *Bulla helicoides* Brocchi, 1814, comme le suggère Risso par son renvoi à Brocchi. = *Ampulla priamus* Gm., 1791, Volutidae.

heptodonta, Jaminia 1826 : 92 (n° 212). « Sous les pierres ».

= Matériel type manquant depuis plus de 100 ans dans la collection Risso puisque Bourguignat (1861) signalait déjà son absence.

* **heterostropha, Clausilia** 1826 : 87 (n° 197). « Sous les pierres des collines ».
= *Papillifera solida* (Drap., 1805), Helicidae, selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 4 syntypes dans la collection Risso du Muséum, mesurant 12 à 13 mm de hauteur.

* **heterostropha, Jaminia** 1826 : 91 (n° 209), pl. 3, fig. 31. « Sous les cailloux du Lazaret ».
= variété de *Jaminia quadridens* (O.F. Müller, 1774) Enidae selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. Un syntype ayant une hauteur de 8 mm est dans la collection Risso du Muséum est étiqueté *Pupa heterostropha*. Espèce type du genre *Jaminia* (Leach Ms) Risso, 1826.

heterostropha, Pupa = cf. heterostropha, Jaminia.

[hians, Fistulana 1826 : 378 (n° 1039)].
= C'est le *Pholas hians* Renier, 1804 qui est synonyme de *Gastrochaena dubia* Penn. 1777, Pholadidae !

[hispida, Helicella « Risso » 1826 : 72 (n° 160)].
= C'est évidemment l'*Helix hispida* L., 1758, devenu *Frutilicola hispida* (L., 1758).

hispidula, Helicella 1826 : 73 (n° 161). « Nos collines ».
= *Candidula apicina* (Lmk., 1822), Helicidae, selon Bourguignat (1861) et Caziot (1919). Matériel type présumé perdu.

[histrix, Ethalion « Risso » 1826 : 36 (n° 87)].
= C'est *Eolidia histrix* Otto, 1821 = *E. hystrix* Otto, 1823 (non *Eolis hystrix* Alder & Hancock, 1843), Aeolidiidae, qui a été inscrite sous le n° 866 dans l'Index officiel des noms zoologiques rejetés ou invalides (opinion 774. *Bull. zool. Nomencl.*, 23 : n° 2-3, 87, 1966) sur proposition de H. Lemche (*Bull. zool. Nomencl.*, 21 : n° 1, 40-43, 1964).

humboldti, Turbonilla 1826 : 394 (n° 1082), pl. 5, fig. 63; Ms : pl. 52 (ici: pl. 11, fig. 206) sous *T. humboltii*, sic. « Régions coralligènes ».
= *Menestho humboldti* (Risso, 1826), Pyramidellidae. Matériel type présumé perdu.

HYGROMIA 1826 : 66.
= Addition proposée à l'Officical List (*Bull. zool. Nomencl.*, 2 : 121, 1958), avec *Helix cinctella* Drap., 1801, Helicidae, comme génotype (Herrmannsen 1846).

(†) * * **imbricata, Lima** 1826 : 306 (n° 818); Ms : pl. 79 (ici : pl. 12, fig. 218). « Moyennes profondeurs (...). Se trouve subfossile ».
= *Lima inflata* (Chemn., 1784), Limidae : 1 paire de valves 18 × 12 mm dans la collection Risso du Muséum (je la désigne comme lectotype de *L. imbricata* Risso, 1826) et une valve de *Lima lima* (L., 1758) de 22 × 16 mm, conservée accidentellement avec le matériel type de *L. imbricata*.

(†) **imbricata, Planaxis** 1826 : 179 (n° 462); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 97). « Fossile à la Trinité ».
= Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

[imbricatus, Murex « Risso » 1826 : 196 (n° 506); Ms : pl. 43].
= C'est *Murex imbricatus* Brocchi, 1814 : 408, pl. 7, fig. 13, Muricidae, dont Risso a annexé le nom. Mais rien ne prouve qu'il ait réellement obtenu cette espèce et il est possible qu'il ait eu en fait *Ocenebra erinacea* (L., 1822).

* **imperfecta, Helicogena** 1826 : 62 (n °135). « Sur toutes nos collines ».
= *Cepaea nemoralis* (L., 1758), variété jaune à bandes interrompues, selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 3 syntypes dans la collection Risso du Muséum (hauteurs 13 à 17 mm).

(†) * **inaequalis, Turritella** 1826 : 106 (n° 248); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 43). « Régions vaseuses (...). Se trouve subfossile ».
= *Turritella* sp. roulées et usées : 2 syntypes de 35 et 27 mm, qui ne correspondent pas à la dimension (30 mm) indiquée par Risso sont dans la collection Risso du Muséum.

incomparabilis, Orbitina 1826 : 82 (n° 184), pl. 3, fig. 23. « Fossés de nos prairies ».
= *Rumina decollata* (L., 1758) Subulinidae; selon Cantraine (1840), Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. Matériel type présumé perdu.

(*) **incomparabilis, Pecten** 1826 : 302 (n° 808), pl. 11, fig. 154; Ms : pl. 89 (ici : pl. 12, fig. 237). « Profondeurs coralligènes ».
= *Propeamussium incomparabile* (Risso, 1826), Pectinidae. Dans la collection Risso du Muséum, on trouve 4 paires de valves (la plus grande 13 × 11 mm) étiquetées *Pecten incomparabilis*, mais ce sont des *Chlamys varia* (L., 1766) juv. ! Il y a eu mélange, puisque l'espèce décrite et figurée par Risso est bien le *Pecten incomparabilis* Auct., et le matériel type doit donc être considéré comme perdu.

† **inflata, Eione** 1826 : 172 (n° 440), pl. 4, fig. 52; Ms : pl. 22 (ici : pl. 9, fig. 64). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

(†) * * **inflata, Mitra** 1826 : 242 (n° 638); Ms : pl. 4. « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Mitra (Mitra) cornicula* (L., 1758), Mitridae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944) : 4 syntypes de 22, 18, 16 et 16 mm. Je désigne le spécimen de 22 mm comme lectotype de *M. inflata* Risso, 1826.

interrupta, Cassis 1826 : 181; Ms : pl. 55 (ici : pl. 11, fig. 184). « Régions coralligènes ».
= Cassididae indét. Matériel type présumé perdu.

italica, Sepia 1845 : 4 (*nomen nudum* à cette date); 1854 : 13, pl. 5, fig. 1-2 (le texte indique : pl. 4, fig. 1-2); Ms : pl. IV (= Risso 1854, pl. 5). « Moyennes profondeurs ».
= *Sepia elegans* Fér. et Orb. 1835-1848, Sepiidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

JAMINIA (Leach Ms) Risso 1826 : 88.
= *Jaminia* (Leach Ms) Risso 1826, Enidae

(= *Iaminia* Leach, 1852, voir à ce sujet l'avant dernière note infrapaginale de l'introduction au présent travail); non *Jaminia* T. Brown, 1827 nec *Jaminea* Gray, 1847 = *Leucophytia* Winckworth, 1949. Génotype : *J. heterostropha* Risso, 1826 = *J. quadridens* (O.F. Müller, 1774).

† **joannis, Pecten** 1826 : 300 (n° 801). « Fossile à St Jean ».
= Pectinidae. Matériel type présumé perdu.

josephinia, Neverita 1826 : 149 (n° 378), pl. 4, fig. 43; Ms : pl. 29 (2 figures) (ici : pl. 9, fig. 74). « Profondeurs sablonneuses ».
= *Neverita josephinia* Risso, 1826, Naticidae. C'est l'espèce type du genre *Neverita* Risso, 1826. Matériel type présumé perdu.

labrosa, Lymnea 1826 : 96 (n° 223). « Iscles [= Isles] du Var ».
= Matériel type disparu de longue date de la collection Risso, car Bourguignat (1861) indique déjà son absence, le carton de l'espèce portant par erreur *Physa fontinalis* (L., 1758).

LACHESIS 1826 : 211.
= (Non *Lachesis* Daudin, 1803 : Reptiles; nec *Lachesis* Savigny : Arachnides) = *Chauvetia* Monterosato, 1884, Buccinidae [= *Nesaea* Risso, 1826 non Lamarck, 1812 nec Leach, 1818 = *Donovania* Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1882 non Leach, 1814 = *Folinaea* Monterosato, 1884 = *Syntagma* Iredale, 1918].

laevigata, Nassa : cf. *Laevigata, Planaxis.*

(†) * * **laevigata, Planaxis** 1826 : 175 (n° 448); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 112). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Naytiopsis granum* (Lmk., 1822), Nassariidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944) : un syntype de 10 mm étiqueté « *Nassa laevigata* » dans la collection Risso du Museum (correspondant à la pl. Ms 32). Ce n'est pas un holotype contrairement à ce qu'indiquent les deux auteurs précités (puisque rien ne prouve que Risso ait basé son espèce sur un seul spécimen), et je le désigne comme lectotype de *P. laevigata* Risso, 1826.

(†) * * **laevigata, Truncatella** 1826 : 125 (n° 300), ? pl. 4, fig. 53 (sous *T. glabra*). « Régions sablonneuses (...). Se trouve subfossile ».
= *Truncatella subcylindrica* (L., 1766), Truncatellidae. 3 syntypes dans la collection Risso du Muséum, de 5 mm chacun. Je désigne l'un d'eux comme lectotype de *T. laevigata* Risso, 1826.

lamarchii (sic), Planaxis : cf. lamarchii (sic) Purpura.

(†) * **lamarchii** (sic), **Purpura** 1826 : 168 (n° 433); Ms : pl. 32 (pl. 9, fig. 94). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Mitrella scripta* (L., 1767), Pyrenidae. 6 syntypes étiquetés *Planaxis lamarchii* Lam. (sic) et mesurant de 11 à 13,5 mm (Risso indique 17 mm dans la diagnose de l'espèce) sont dans la collection Risso du Muséum.

LEACHIA 1826 : 102.
(Non *Leachia* Lesueur 1821 = Cephalopoda; nec *Leachia* Jeffreys, 1833 = *Lymnaea* Lmk., 1799). Sous ce nom Risso a mélangé plusieurs espèces d'Hydrobiidae et Cyclostomatidae.

* **leachiana, Lymnea** 1826 : 95 (n° 222), pl. 3, fig. 32. « Tous nos fossés ».
= *Lymnaea palustris* (Müller, 1774), Lymnaeidae, selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 3 syntypes dans la collection Risso du Muséum (mesurant de 16 à 21 mm de hauteur).

* * **lemania, Ranella** 1826 : 202 (n° 523), pl. 8, fig. 113; Ms : pl. 46 (ici : pl. 10, fig. 168) sous *R. lemanii.* « Régions coralligènes ».
= *Cymatium cutaceum* (L., 1799), Cymatiidae, juv. de 10 mm, que Fischer-Piette et Beigbeder (1943) qualifient d'holotype (alors que rien ne prouve que Risso ait basé son espèce sur un seul spécimen) : je le désigne comme lectotype de *R. lemania* Risso, 1826.

LEMBULUS (Leach Ms) Risso, 1826 : 319.
= (Non *Lembulus* Leach *in* Sowerby 1842, Conch. Man., ed. 2 : 170 = *Nucula* Lmk., 1799) = *Lembulus* (Leach Ms) Risso 1826, sous-genre de *Nuculana* Lmk., 1807.

LEMINTINA 1826 : 144 et **LEMENTINA** 1826 : 432.
= ? *Serpulorbis* Sassi, 1827, sous-genre de *Vermetus* Daudin, 1800, Vermetidae. Type de *Lemintina* (par monotypie) : *L. cuvieri* Risso, 1826. Sur *Lemintina* et ses difficultés d'interprétation, voir Chavan (1944).

† **leonardiana, Mitra** 1826 : 243 (n° 642); Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 7a). « Fossile à la Trinité ».
= Mitridae. Matériel type présumé perdu.

LEPIDOPLEURUS (Leach Ms) Risso, 1826 : 269.
= *Lepidopleurus* (Leach Ms) Risso, 1826, Lepidopleuridae. (= *Lepidopleurus* Leach, 1852) non *Lepidopleurus* Carpenter *in* Dall 1879 qui est *Lepidozona* Pilsbry, 1892, selon Smith A.G. (1960). Espèce type (désignation subséquente par J.E. Gray, 1847) : *Chiton cajetanus* Poli, 1791.

lepus, Dolabella 1826 : 44 (n° 100). « Régions vaseuses ».
= *Aplysia fasciata* Poiret, 1789, Aplysiidae, selon Eales (1960) (cf. liste officielle, Opinions 200 et 354. *Bull. zool. Nomencl.*). Matériel type présumé perdu.

lesueri (*sic*) **Pterotrachea** 1826 : 29, pl. 2, fig. 14. « Profondeurs sablonneuses ».
= *Firoloidea desmaresti* Lesueur, 1817, Hétéropode. Matériel type présumé perdu.

levigata (*sic*), **Lima** 1826 : 305 (n° 817); pl. Ms 79 (ici : pl. 12, fig. 219 a), sous *L. laevigata* (*sic*). « Région des algues ».
= *Lima (Mantellum) hians* (Gm., 1791), Limidae, selon plusieurs auteurs, ce que confirme la pl. Ms 79. Matériel type présumé perdu.

(†) **levigata** (*sic*), **Mitrella** 1826 : 248 (n° 656). « Subfossile ».
Matériel type présumé perdu.

* **libellula, Helicogena** 1826 : 62 (n° 134), pl. 3, fig. 21. « Sur nos collines ».
= *Cepaea nemoralis* (L., 1758), variété jaune

sans bandes, Helicidae, selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 3 syntypes dans la collection Risso du Muséum, mesurant 15 à 17 mm de hauteur.

(†) * * **lineata, Alvania** 1826 : 142 (n° 355), pl. 9, fig. 120; Ms pl. 16 (ici : pl. 8, fig. 53). « Régions coralligènes » (...). Se trouve subfossile ».
= *Alvania lineata* Risso, 1826, Rissoidae. Bien qu'*Alvania nodulosa* Risso, 1826 (voir cette entrée) ait priorité de page, je choisis en tant que premier réviseur (ICZN article 24) *A. lineata* Risso, 1826 comme nom à utiliser (afin de favoriser la stabilité de la nomenclature). La collection Risso du Muséum contient une seule coquille de 4 mm (dimension indiquée par Risso), que je désigne comme lectotype.

† **lineata, Ostrea** 1826 : 290 (n° 764). « Fossile au Lazaret ».
Matériel type présumé perdu.

lineatus, Arion 1826 : 55 (n° 117). « Dans les champignons ».
= (Non *Arion lineatus* Dumont, 1849. Bull. Soc. Hist. nat. Savoie, 1 : 64). Selon Bourguignat (1861) c'est *Arion hortensis* Fér., 1819, Arionidae, et selon Caziot (1919), un mélange probable de plusieurs espèces. Matériel type présumé perdu.

lineatus, Policere 1826 : 30 (n° 73), pl. 1, fig. 5. « Sur les fucus ».
= *Polycere quadrilineata* (O.F. Müller, 1776), Polyceridae, selon Pruvot-Fol (1936b, 1954). Matériel type présumé perdu.

* * **lineolata, Arctoe** 1826 : 362 (n° 993); Ms : pl. 87 (ici : pl. 12, fig. 244). « Régions coralligènes ».
= *Loripes lacteus* (L., 1758), Lucinidae. 2 syntypes (= 2 valves isolées de 17 × 18 et 13 × 14 mm, le premier chiffre étant la hauteur) étiquetés *Artemis lineolata,* sont dans la collection Risso du Muséum. Je désigne la plus grande valve (qui a la dimension indiquée par Risso : 18 mm) comme lectotype d'*Arctoe lineolata* Risso, 1826.

lineolata, Artemis : cf. lineolata, Arctoe.

(*) **lineolata, Leachia** 1826 : 103 (n° 241). « Lieux humides ».
= *Pomatias patulus* (Drap., 1801), Cyclostomatidae, selon Bourguignat (1861) et Caziot (1919) qui ont vu le matériel type. Actuellement, sous ce nom, la collection Risso du Muséum montre 4 petits Hydrobiidae (hauteur : 3 à 4 mm).

(†) * * **lineolata, Mangelia** 1826 : 220 (n° 576). « Régions sablonneuses (...). Se trouve subfossile ».
= *Mangelia lineolata* Risso, 1826, qui a priorité sur *Mangelia multilineolata* (Desh., 1832) qui est la même espèce : 5 syntypes dans la collection Risso du Muséum : 10, 6, 6, 5 et 4 mm (je désigne comme lectotype de *M. lineolata* Risso, 1826 le syntype de 10 mm).

lineolata, Nassa : cf. lineolata, Planaxis.

* * **lineolata, Planaxis** 1826 : 173 (n° 441), pl. 9, fig. 136; Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 99). « Dans les endroits abrités des bords rocailleux ».
= *Hinia costulata* (Renier, 1804) = *Nassa cuvieri* Payr., 1826, Nassariidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944). La collection Risso du Muséum contient un unique spécimen de 12 mm, étiqueté « *Nassa lineolata* », que les auteurs qualifient d'holotype : il s'agit en fait d'un syntype, que je désigne ici comme lectotype de *Planaxis lineolata* Risso, 1826.

†(*) **lineolata, Purpura** 1826 : 168 (n° 431); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 92). « Fossile à Magnan et à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu, car, dans la collection Risso l'étiquette originale est maintenant associée à une coquille sans rapport avec la diagnose et la figure de Risso.

* **lineolata, Tellina** 1826 : 347 (n° 942); Ms : pl. 85 (ici : pl. 12, fig. 241). « Régions sablonneuses ».
= *Tellina pulchella* Lmk., 1818, Tellinidae. 3 syntypes (comportant chacun une paire de valves) de 27 × 14, 27 × 13 et 24 × 11 mm sont dans la collection Risso. Aucun de ces syntypes ne correspond à la dimension (20 mm) indiquée par Risso.

lineolatus, Limax 1826 : 57 (n° 124). « Sous les pierres des endroits agrestes ».
= sp. indét. « putréfiée dans l'alcool et complètement perdue » (Bourguignat, 1861). Matériel type présumé perdu.

* * **lineolatus, Trochus** 1826 : 128 (n° 311), pl. 9, fig. 119; Ms : pl. 35 (ici : pl. 9, fig. 124). « Régions des algues ».
= *Calliostoma zizyphinus* (L., 1766), Trochidae. La collection Risso du Muséum contient une coquille à apex brisé mesurant 7 mm (ce qui peut correspondre à la dimension indiquée par Risso : 8 mm), que je désigne comme lectotype de *Trochus lineolatus* Risso, 1826.

† **listeri, Cancellaria** 1826 : 188 (n° 484); Ms : pl. 51 (ici : pl. 10, fig. 181) sous *C. listerii*. « Fossile à la Trinité ».
= Cancellariidae. Matériel type présumé perdu.

(†) * * **littoralis, Mitra** 1826 : 243 (n° 639). « Bords du littoral (...). Se trouve subfossile ».
= *Vexillum (Pusia) ebenus* (Lmk., 1811), Mitridae, comme Fischer-Piette et Beigbeder l'ont signalé (1944). La collection Risso du Museum contient 2 syntypes de 14 mm, correspondant à la dimension (15 mm) indiquée par Risso. Je désigne l'un d'eux comme lectotype de *M. littoralis* Risso, 1826.

* * **lividulum, Cerithium** 1826 : 154 (n° 388); Ms: pl. 8 (ici : pl. 8, fig. 25). « Régions des algues ».
= *Cerithium lividulum* Risso, 1826 = *C. mediterraneum* Desh., 1843, Cerithiidae; non synonyme de *C. rupestre* Risso, 1826, contrairement à ce que divers auteurs ont supposé. Dans la collection Risso du Muséum, on trouve 3 syntypes de 22, 20 et 20 mm. Je désigne celui de 22 mm (dimension indiquée par Risso dans la diagnose) comme lectotype de *Cerithium lividulum* Risso, 1826.

LOLIDONA 1826 : 33.
= *Histioteuthis* Fér. et Orb. 1835-1848, Histioteuthidae, selon Adam (1942).

LOLIMNITES 1826 : 41.
= *Ommastrephes* Orb., 1835, Ommastrephidae, car la seule espèce que Risso range dans *Lolimnites, L. meridionalis* Risso, est un *Ommastrephes*.

† **longi-sipho, Fusus** 1826 : 210 (n° 546); Ms : pl. 48 (ici : pl. 10, fig. 174), sous *Fusus longisypho*. « Fossile à Magnan » [Nice].
= C'est probablement le *Murex longiroster* Brocchi, 1814, 418, pl. 8, fig. 7, que Risso a rebaptisé *Fusus longi-sipho*. Mais le matériel type de ce Fasciolariidae est présumé perdu.

* * **loques, Planaxis** 1826 : 177 (n° 456); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 103), sous *P. loquez*. « Régions coralligènes ».
= *Hinia costulata* (Renier, 1804) = *Nassa cuvieri* Payr., 1826, Nassariidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944). L'unique spécimen de la collection Risso du Museum mesure 10 mm, dimension indiquée par Risso dans sa diagnose : ce n'est pas un holotype, contrairement à ce qu'indiquent les auteurs précités, mais un syntype que je désigne comme lectotype de *Planaxis loques* Risso, 1826.

* * **lucidus, Trochus** 1826 : 126 (n° 305); Ms : pl. 35 (ici : pl. 9, fig. 120). « Régions coralligènes ».
= *Calliostoma conulum* (L., 1766), Trochidae. La collection Risso du Muséum contient 2 syntypes de 20 et 14 mm. Je désigne le syntype de 20 mm (dimension indiquée par Risso) comme le lectotype de *T. lucidus* Risso, 1826.

lucostoma, Helix : cf. lucostoma, Theba.

* **lucostoma, Theba** 1826 : 76 (n° 172). « Nos campagnes ».
= *Theba pisana* (O.F. Müller, 1774), juv., Helicidae. 4 syntypes dans la collection Risso du Muséum, étiquetés *Helix lucostoma* et mesurant 5 à 6 mm de hauteur.

* **lugubris, Patella** 1826 : 262 (n° 698). « Sur les rochers peu profonds ».
= *Patella caerulea* L., 1758, Patellidae. Risso lui-même (Ms 2052, systématique a, p. 156) assimile son espèce à *P. bonnardi* Payr., 1826, c'est-à-dire à la var. *tarentina* de *P. caerulea*. 3 syntypes dans la collection Risso du Museum, mesurant 34 × 23 × 8, 21 × 19 × 7 et 14 × 11 × 5 mm.

lutea, Aplysia 1818 : 375; 1826 (n° 99). « Sous les galets ».
= *Aplysia* indét., Aplysiidae, selon Rang (1828) et Pruvot-Fol (1954). Matériel type présumé perdu.

lutea, Doris 1818 : 369; 1826 : 31 (n° 76). « Anses abritées ».
= *spec. dubia*, car « la description est manifestement insuffisante, ne comportant aucun détail précis où accrocher même une probabilité » (Pruvot-Fol, 1936b). Matériel type présumé perdu.

macluriana, Clausilia 1826 : 87 (n° 198). « Pieds des rochers ».
= *Papillifera solida* (Drap., 1805), var., Clausiliidae, selon Bourguignat (1861) et Caziot (1919). Matériel type présumé perdu.

macropus, Octopus 1926 : 3 (n° 3); 1845 : 4; 1854 : pl. 24; Ms : pl. XXIII-XXIV (= Risso 1854, pl. 24). « Rochers profonds ».
= *Octopus macropus* Risso, 1826, Octopodidae. Le matériel type de cette bonne espèce est présumé perdu.

MACTRULA 1826 : 368.
= *Mactrula* Risso, 1826, Ungulinidae. (Non *Mactrula* Marwick, 1948, N.Z. geol. Surv. Paleont. Bull. 16 : 22, renommé *Mactrona* Marwick 1952, Proc. malac. Soc. Lond., 29 : 83, Ungulinidae).

maculatus, Trochus 1826 : 128 (n° 309); Ms : pl. 35 (ici : pl. 9, fig. 125). « Régions des algues ».
= (Préoccupé par *Trochus maculatus* L., 1785 et L., 1767). Cette espèce de Risso, traditionnellement considérée comme synonyme de *Calliostoma laugieri* (Payr., 1826), Trochidae, depuis Monterosato (1884), n'est peut être même pas un *Calliostoma*, à en juger par la figure (assez mauvaise) de la pl. Ms 35, mais un *Monodonta*, peut être *M. turbinata* (Born, 1780) à spire courte. Matériel type présumé perdu : il est donc sans intérêt de donner un nouveau nom au *Trochus maculatus* Risso, 1826 non Linné, 1758.

† **magnan, Cerithium** 1826 : 155 (n° 393); Ms : pl. 8 (ici : pl. 8, fig. 21). « Fossile dans les argiles tertiaires de Magnan » [Nice].
Matériel type présumé perdu.

(*) **major, Succinea** 1826 : 59 (n° 127). « Fossés aquatiques ».
= Mélange de *Succinea putris* L., 1758 et de *S. elegans* Risso, 1826, Succineidae, selon Bourguignat (1861) ! Matériel type non retrouvé (mais son étiquette originale, isolée, existe dans la collection Risso du Muséum).

(†) * * **mamillata, Alvania** 1826 : 145 (n° 363), pl. 9, fig. 128. « Régions des algues » (...). Se trouve subfossile ».
= *Alvania cimex* (L., 1767), Rissoidae. La collection Risso du Muséum contient 2 syntypes de 4 et 5 mm. Je désigne le syntype de 4 mm (dimension qu'indique Risso dans la diagnose) comme lectotype d'*Alvania mamillata* Risso, 1826.

* * **mamillata, Fissurella** 1826 : 257 (n° 683), pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 17). « Régions madréporiques ».
= *Glyphis gracea* (L., 1766), Fissurellidae. La collection Risso du Muséum contient une coquille étiquetée « *Fisurella mamelata* » (sic), de 8 × 5 × 3 mm, qui correspond à la longueur qu'indique Risso (8 mm) : je la désigne comme lectotype de *Fissurella mamillata* Risso, 1826.

(*) **mamillata, Helicella** 1826 : 70 (n° 153). « Nos campagnes ».
= *Helicigona lapicida* (L., 1758), juv., Helicidae, selon Bourguignat (1861) et Caziot

(1919). Matériel type non retrouvé ; seule l'étiquette originale (*Helix mamellata,* sic) existe dans la collection Risso du Muséum.

mamillata, Helix : cf. mamillata, Helicella.

mamillata, Lachesis 1826 : 211 (n° 549), pl. 5, fig. 65; Ms : pl. 53 (ici : pl. 11, fig. 212). « Régions coralligènes ».
= *Chauvetia minima* (Montagu, 1803), var., Buccinidae. Matériel type présumé perdu.

* * **mamillata, Nesaea** 1826 : 223 (n° 586), pl. 5, fig. 69; Ms : pl. 48 (ici : pl. 10, fig. 176). « Régions des algues ».
= *Chauvetia minima* (Montagu, 1803), Buccinidae. 5 syntypes de 7 à 4 mm dans la collection Risso du Muséum. Le plus grand correspond exactement à la taille indiquée par Risso; je le désigne comme lectotype de *Nesaea mamillata* Risso, 1826.

* **mamillata, Patella** 1826 : 261 (n° 694). « Régions coralligènes ».
= (Non *Patella mamillata* (Nuttall) Reeve, 1855 : Acmaeidae). La collection Risso du Museum contient une coquille extrêmement usée, indéterminable, étiquetée *Lepeta Patella mamillatus,* et mesurant 11 × 9 × 4 mm. Cette coquille ne correspond pas à la dimension indiquée par Risso (8 mm).

† **mamillata, Planaxis** 1826 : 178 (n° 459), pl. 9, fig. 122. « Fossile à la Trinité ».
= *Hinia reticulata* (L., 1758), var., Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

(†) * * **mamillatum, Cerithium** 1826 : 158 (n° 403), pl. 4, fig. 55; Ms : pl. 8 (ici : pl. 8, fig. 27). « Subfossile ».
= (Non *C. mamillatum* Phil., 1836) *Bittium reticulatum* (Da Costa, 1779), Cerithiidae. 2 syntypes de 11 et 10 mm dans la collection Risso du Museum, plus ou moins usés. Je désigne le plus grand (qui peut correspondre à la dimension indiquée par Risso : 12 mm) comme lectotype de *C. mamillatum* Risso, 1826.

MANGELIA 1826 : 219.
= *Mangelia* Risso, 1826, Turridae (= *Mangilia,* Loven, 1846, émendation invalide). Type (désignation subséquente par Herrmannsen, 1852) : *Mangelia striolata* Risso, 1826 = *Mangelia attenuata* (Montagu, 1808).

† **mantelianus, Murex** 1826 : 200 (n° 158); Ms : pl. 44 (ici : pl. 10, fig. 160). « Fossile de la Trinité, à Saint-Jean ».
= Fasciolariidae [? *Fusinus* cf. *rostratus* (Olivi, 1792)] selon la pl. Ms 44. Matériel type présumé perdu.

* **marcelia, Clausilia** 1826 : 86 (n° 196). « Sous les cailloux de nos montagnes ».
= *Clausilia parvula* Studer, 1820, Clausiliidae, selon Chevallier (1976) : 2 syntypes dans la collection Risso du Museum, étiquetés *Clausilia morgelia* (sic) et mesurant 7 et 10 mm de hauteur.

margaritacea, Vulsella 1826 : 307 (n° 823), pl. 12, fig. 168. « Régions coralligènes ». Matériel type présumé perdu.

* * **margaritaceus, Phorcus** 1826 : 133 (n° 328), pl. 4, fig. 47; Ms : pl. 37 (2 figures) (ici : pl. 9, fig. 129); 1813 : 201 sous *Turbo variegatus* (*nomen nudum*). « Bords rocailleux ».
= *Gibbula (Phorcus) richardi* Payr., 1826; Trochidae, comme cela a été admis par divers auteurs, à la suite de Monterosato (1884) et comme Risso (Ms 2052, systématique a, p. 169) le reconnaît lui-même. 4 syntypes de 13 à 10 mm dans la collection Risso du Muséum. Je désigne le plus grand (qui peut correspondre à la dimension indiquée par Risso (14 mm) comme lectotype de *Phorcus margaritaceus* Risso, 1826.

marminia, Mitrella 1826 : 272 (n° 720), pl. 5, fig. 64. « Régions coralligènes ».
= *Pisania orbignyi* (Payr., 1826), Buccinidae. Matériel type présumé perdu.

marmorata, Doris 1818 : 369; 1826 : 32 (n° 77). « Sous les cailloux ».
= *Doris marmorata* Risso, 1818, Doridiidae (non *Doris marmorata* Fér., Orb. et Audouin *in* Savigny, 1826; nec Kelaart, 1858), c'est-à-dire bonne espèce, selon Schmekel (1968), qui la date par erreur de 1826. Pruvot-Fol (1936b, 1954) datait aussi l'espèce de 1826 mais la considérait comme indéterminable. Matériel type présumé perdu.

marmorata, Eidothea 1826 : 46 (n° 102), pl. 1, fig. 9. « Notre plage » [= plage de Nice].
= *Aglaja depicta* Renier 1807 = *Acera marmorata* Cantr. = *Acera aplysiaeformis* Delle Chiaje, Aglajidae, selon Cantraine (1840), repris par d'autres auteurs. Matériel type présumé perdu.

(†) * * **marmorata, Natica** 1826 : 147 (n° 372); Ms : pl. 24 (ici : pl. 9, fig. 69). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Polynices guillemini* (Payr., 1826), Naticidae, comme l'ont admis plusieurs auteurs à la suite de Petit (1869). 3 syntypes de 8, 8 et 6 mm dans la collection Risso du Muséum (mélangées aux 3 syntypes, on trouve 2 *Neverita josephina*), dont aucun ne correspond à la taille indiquée par Risso (15 mm). Je désigne l'un des syntypes de 8 mm comme lectotype de *Natica marmorata* Risso, 1826.

† **martini, Fusus** 1826 : 210 (n° 547); Ms : pl. 48 (ici : pl. 10, fig. 175). « Fossile à Magnan » [Nice].
= Fasciolariidae. Matériel type présumé perdu.

† **massena, Anna** 1826 : 214 (n° 556), pl. 5, fig. 68; Ms : pl. 53 (ici : pl. 11, fig. 208). « Fossile à la Trinité ».
= *Incertae sedis* selon diagnose et figures (bien différentes l'une de l'autre et assez atypiques) mais = *Cantharus scacchianus* (Phil.), Buccinidae, *fide* Dall (1918. Proc. U.S. nat. Mus., 54 : 322), qui avait pu voir le type chez Risso à Nice.
Matériel type présumé perdu.

matonia, Nerita 1826 : 271 (n° 717). « Régions sablonneuses ».
= *Smaragdia viridis* (L., 1766), Neritidae. Matériel type présumé perdu.

maxima, Nacca 1826 : 148 (n° 374); Ms : pl. 29 (ici : pl. 9, fig. 71). « Grandes profondeurs »,

= *Natica (Nacca) hebraea* (Martyn, 1769), Naticidae, selon Monterosato (1884) et les auteurs postérieurs. C'est l'espèce type du sous-genre *Nacca* Risso, 1826. Matériel type présumé perdu.

(†) **media, Mitra** 1826 : 242 (n° 637). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Mitra (Mitra) cornicula* (L., 1758), Mitridae. Matériel type présumé perdu.

(†) * * **mediterranea, Alvania** 1826 : 140 (n° 349); Ms : pl. 16 (ici : pl. 8, fig. 55). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= C'est un synonyme d'*Alvania discors* (Allan, 1818), ayant lui-même pour synonyme *A. montagui* Payr., 1826 (cf. entrée *discors, Alvania*). La collection Risso du Muséum contient 6 syntypes de 4 à 5 mm. Je désigne un spécimen de 5 mm comme lectotype de l'*Alvania mediterranea* Risso, 1826.

* * **mediterranea, Cypraea** 1826 : 239 (n° 627); Ms : pl. 33 (ici : pl. 9, fig. 115). « Régions des algues ».
= *Trivia europaea* (Montagu, 1808), Triviidae. La collection Risso du Muséum contient 6 syntypes de 10 à 8 mm, ne justifiant pas de considérer l'espèce de Risso comme une espèce, une sous-espèce ou une variété particulière, comme l'ont fait divers auteurs. Je désigne le plus petit spécimen (8 mm) comme lectotype de *Cypraea mediterranea* Risso, 1826 (c'est peut être lui dont Risso indique la longueur : 7 mm).

* * **mediterranea, Gibbula** 1826 : 136 (n° 335); Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 136). « Régions des algues ».
= *Gibbula umbilicaris* (L., 1766), Trochidae, comme cela a été admis depuis Petit (1869). La collection Risso du Muséum contient 3 syntypes étiquetés *Trochus mediterranea,* de 14, 13 et 12 mm. Je désigne le plus grand (qui peut être celui dont Risso indique la dimension : 15 mm) comme lectotype de *Gibbula mediterranea* Risso, 1826.

* **mediterranea, Nassa** 1826 : 170 (n° 437). «Régions sablonneuses» [Nice : cf. ci-dessous].
= *Sphaeronassa mutabilis* (L., 1767), Nassariidae. La collection Risso du Muséum contient 5 syntypes de 20, 19, 19, 19 et 18,5 mm (dont un marqué « Nice »), déjà révisés par Fischer-Piette et Beigbeder (1944). Mais Risso indique 25 mm dans sa diagnose.

mediterranea, Septaria 1826 : 379 (n° 1040); Ms : pl. 82 (ici : pl. 12, fig. 233). « Sous la carène des bâtiments du port » [de Nice].
= *Nototeredo norvagica* (Spengler, 1792), Terenidae, selon Lamy (1927). Matériel type présumé perdu.

(†) **mediterraneum, Tritonium** 1826 : 203 (n° 526). « Régions rocailleuses (...). Se trouve subfossile ».
= *Charonia lampas* (L., 1758), Cymatiidae, comme l'avait déjà admis Petit (1869). Matériel type présumé perdu.

† **menardiana, Mangelia** 1826 : 222 (n° 583), pl. 9, fig. 130; Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 204) sous *M. menardii.* « Fossile à la Trinité ».
= Matériel type présumé perdu.

menardii, Mangelia : cf. menardiana, Mangelia.

meridionalis, Bulimus : cf. meridionalis, Cochlicella.

* **meridionalis, Bythinia** 1826 : 100 (n° 234), pl. 3, fig. 28. « Fossés aquatiques ».
= *Pseudamnicola similis* (Drap., 1805), Hydrobiidae, selon Bourguignat (1861) et divers auteurs postérieurs. Selon Boeters (1971. Arch. Mollusk., 101 : 178), c'est un synonyme de *Mercuria confusa* (Frauenfeld, 1863), Hydrobiidae. La collection Risso du Muséum contient 4 syntypes mesurant 3 à 4 mm de hauteur, auxquels étaient mélangés 5 spécimens du Littorinidae *Melaraphe neritoides* (L., 1766) !

* **meridionalis, Cochlicella** 1826 : 78 (n° 175), pl. 3, fig. 26 (sous *Helicella meridionalis*). « Isles du Var ».
=*Cochlicella acuta* (Müller, 1774), Helicidae, comme Risso lui-même le suggère par ses deux renvois à Draparnaud et Férussac. 2 syntypes, brisés, dans la collection Risso du Muséum, étiquetés *Bulimus meridionalis* et mesurant environ 10 et 20 mm de hauteur.

meridionalis, Helicella : cf. meridionalis, Cochlicella.

meridionalis, Loligopsis 1845 : 4.
= *nomen nudum* (cf. *meridionalis, Lolimnites*).

meridionalis, Lolimnites 1854 : 41, pl. 16, fig. 1-3 (le texte indique : pl. 19); Ms : pl. XVI (= Risso 1854, pl. 16). *Loligopsis meridionalis* 1845 : 4 est un *nomen nudum* pour la même espèce. « Régions profondes ».
= *Ommastrephes bartrami* (Lesueur, 1821), Ommastrephidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

* **meridionalis, Theba** 1826 : 76 (n° 171). « Sur des plantes méridionales du littoral ».
= *Eobania vermiculata* (Müller, 1774), juv., Helicidae, selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 3 syntypes dans la collection Risso du Muséum.

mezzaro, Ocythoe 1845 : 7 (*nomen nudum* à cette date, sous *Ocithoe,* sic); 1854 : 49, pl. 19, fig. 1-2 (le texte indique pl. 22, fig. 1-2); Ms : pl. XXI (= Risso 1854, pl. 19). « Région sablonneuse ».
= *Tremoctopus violaceus* Delle Chiaje, 1830, Tremoctopidae, selon Vérany *in* Risso (1845) et Adam (1942). La disparition du matériel type de cette espèce a été très précoce car Vérany (1851) dit qu'il a « vainement cherché dans la collection de M. Risso ce mollusque ».

[miliaris, Trochus 1826 : 130 (n° 317) : Ms : pl. 35].
= C'est *Trochus miliaris* Brocchi, 1814 que Risso s'attribue pour une raison inconnue, tout en se référant à Brocchi ! Selon Rossi-Ronchetti (1955), cette espèce doit être nommée *Calliostoma* (*Ampullotrochus*) *miliare* (Brocchi, 1814), Trochidae.

minor, Argonauta [1845] : 4 (*nomen nudum*); 1854 : 77, pl. 33, fig. 1-2. « Régions sablonneuses ».
= *Argonauta argo* L., 1758, Argonautidae, selon Robson (1932) et Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

MITRELLA 1826 : 247.
= *Mitrella* Risso, 1826, Pyrenidae. Type *Mitrella flaminea* Risso, 1826 = *M. scripta* (L., 1822).

* **mitrella, Voluta** 1826 : 250 (n° 661), pl. 10, fig. 143. « Régions coralligènes ».
= *Marginella mitrella* Risso, 1826, Marginellidae qui a priorité sur *Marginella secalina* Phil., 1836. La collection Risso du Muséum contient 6 syntypes de 8 mm (Risso indique 10 mm dans sa diagnose) que Fischer-Piette et Beigbeder (1944) citent par erreur sous *Volutella mitrella.*

mitrella, Volutella : cf. mitrella, Voluta.

* **modesta, Bulla** 1826 : 49 (n° 105), pl. 1, fig. 7. « Régions coralligènes ».
= *Haminea hydatis* (L., 1758), Bullidae. La collection Risso du Muséum contient 3 syntypes de 7 à 8 mm, alors que Risso indique 12 mm dans sa diagnose.

modesta, Donax 1826 : 340 (n° 920). « Régions des algues ».
= *Donax* (*Serrula*) *venusta* Poli, 1795, Donacidae, selon Monterosato (1884) et divers auteurs. Matériel type présumé perdu.

† * * **molliana, Planaxis** 1826 : 176 (n° 454); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 109). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Hinia costulata* (Renier, 1804) = *Nassa cuvieri* Payr., 1826, Nassariidae. La collection Risso du Muséum contient 3 coquilles usées de 8, 7,5 et 6 mm. Le plus grand de ces syntypes, dont la dimension est la même que celle indiquée par Risso a été qualifié à tort d'holotype par Fischer-Piette et Beigbeider (1944) : je le désigne comme lectotype de *P. molliana,* Risso, 1826.

† **monieriana, Ammonites** 1826 : 11 (n° 20); Ms : pl. LXVIII (ici : pl. 12, fig. 257). « Calcaire alpin, col de Monnier ».
Matériel type présumé perdu.

† **montfortianus, Nautilus** 1826 : 9 (n° 14); Ms : pl. XLVI (ici : pl. 12, fig. 250). « Marne chloritée, Mont-Chauve ».
Matériel type présumé perdu.

* **morio, Gibbula** 1826 : 136 (n° 337); Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 143). « Régions rocailleuses ».
= *Clanculus jussieui* Payr., 1826, Trochidae, (et non *C. cruciatus* comme le supposait Monterosato, 1884). 3 syntypes dans la collection Risso du Muséum, mesurant 10, 9 et 9 mm et étiquetés *Trochus morio.*

morio, Trochus : cf. morio, Gibbula.

[moschata, Eledona « Risso » 1854 : 43, pl. 31 (le texte indique pl. 20, fig. 1-2; Ms : pl. XXXIII]. *Eledone moschata* (Lmk., 1798), Octopodidae, et non une espèce de Risso.

[multidentata, Jaminia « Risso » 1826 : 92 (n° 213)].
= Il s'agit très probablement de *Pupa multidentata* Olivi, 1792 dont le nom est repris par Risso pour une espèce en réalité différente, qui n'est autre que *Clausilia polita* Risso, 1826. Dans sa collection, on trouve actuellement les 2 spécimens de ce Clausiliidae vus par Caziot (1919) : ils sont étiquetés *Pupa multidentata* et leurs dimensions (hauteur : 13 et 15 mm) ne correspondent pas aux indications de Risso.

muricata, Cancellaria 1826 : 188 (n° 483) : Ms : pl. 51 (ici : pl. 10, fig. 180). « Fossile à la Trinité ».
= Cancellariidae. Matériel type présumé perdu.

† (†) **muricata, Scalaria** 1826 : 113 (n° 272), pl. 4, fig. 45; Ms : pl. 12 (ici : pl. 8, fig. 30). « Régions sablonneuses (...). Se trouve subfossile et fossile ».
= *Epitonium aculeatum* (Allan, 1818), Epitoniidae, car Risso se réfère à *Turbo aculeatus* Allan, 1818 : 456 (tiré à part 30) n° 5, pl. 10, fig. 9; il se réfère aussi à un *Turbo muricatus* qu'il croit à tort, avoir signalé en 1813 (non *Turbo muricatus* Dujardin). A noter que *Scalaria cantrainei* Weinkauff, 1866 que Monterosato (1876) considérait comme le nom correct de *S. muricata* Risso, passe lui aussi dans la synonymie d'*E. aculeatum* Allan, 1818. Matériel type présumé perdu.

NACCA 1826 : 148.
= *Nacca* Risso, 1826, sous-genre de *Natica* Scopoli, 1777, Naticidae. Type : *Nacca maxima* Risso, 1826 = *Natica* (*Nacca*) *hebraea* Martyn, 1769.

NANINA 1826 : 150.
= *Cyclope* Risso, 1826, juv., Nassariidae, le type de *Nanina* étant (par monotypie) : *N. unifasciata* Risso, 1826 = *Cyclope neritea* (L., 1767).

[naticoides, Cantareus « Risso » 1826 : 64 (n° 140)].
= C'est l'*Helix naticoides* Drap., 1801, changé de genre par Risso. = *Cantareus aperta* (Born, 1778), Helicidae. Le matériel de Risso existe encore dans sa collection.

* **neritoïdea, Cyclope** 1826 : 170 (n° 436); Ms : pl. 22 (ici : pl. 9, fig. 66), sous *Eione neritoidea.* « Régions vaseuses ».
= *Cyclope neritea* (L., 1767), Nassariidae. 5 syntypes dans la collection Risso du Muséum, étiquetés *Cyclops neritoides* (sic) et déjà révisés par Fischer-Piette et Beigbeder (1944).

neritoidea, Eione : cf. *neritoidea, Cyclope.*

NESAEA 1826 : 223, et **NESEA** pl. Ms. 48.
= (Non *Nesaea* Lmk., 1812, Polypier; nec *Nesaea* Leach, 1818 : Crustacé) = *Chauvetia* Monterosato, 1884, Buccinidae [= *Lachesis* Risso, 1826 *non* Daudin, 1803 *nec* Savigny = *Donovania* Bucq. Daut. Dollf., 1882 non Leach, 1814 = *Folinaea* Monterosato, 1884 = *Syntagma* Iredale, 1918].

NEVERITA 1826 : 149.
= *Neverita* Risso, 1826, Naticidae. Type (par monotypie) = *N. josephinia* Risso, 1826.

[nicoeensis, Helicogena « Risso » 1826 : 61, pl. 2, fig. 19-20].
= C'est l'*Helicogena niciensis* (Fér., 1822), Helicidae.

nicaeensis, Phasianella : cf. nicaeensis, Tricolia.

* * **nicaeensis, Simnia** 1826 : 235 (n° 617), 436 (sous *Scymnia nicaeensis*), pl. 10, fig. 150; Ms : pl. 33 (ici : pl. 9, fig. 113) sous *Ovula nicaeensis*. « Régions coralligènes ».
= *Simnia nicaeensis* Risso, 1826, Ovulidae. 1 syntype incomplet et brisé de 14 mm dans la collection Risso du Muséum. Bien que plus petit que le spécimen mesuré par Risso (17 mm), je désigne ce syntype, déjà figuré par Schilder (1932), comme lectotype de *S. nicaeensis* Risso, 1826, qui est l'espèce type du genre *Simnia* Risso, 1826, et dont *S. purpurea* Risso, 1826 n'est pas synonyme.

* * **nicaeensis, Tricolia** 1826 : 122 (n° 292), pl. 5, fig. 62; Ms : pl. 39 (ici : pl. 10, fig. 148) sous *Phasianella nicaensis*. « Régions des algues ». = *Phasianella speciosa* (Megerle von Mühlfeld, 1824), Turbinidae, selon Petit (1869) et auteurs postérieurs. 1 syntype de 10 mm marqué « lectoparatype selon Robertson, 1962 », et qui est plutôt un lectotype est conservé dans la collection Risso du Muséum.

niger, Octopus 1845 : 4 (*nomen nudum* à cette date); 1854 : 55, pl. 23 (le texte indique : pl. 24, fig. 1); Ms : pl. XXXV (= Risso, 1854, pl. 23); non Rafinesque 1814 (*nomen nudum*). « Rochers des profondeurs moyennes ».
= ? *Octopus vulgaris* Lmk., 1798 ou *Octopus rugosus* (Bosc, 1792), Octopodidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

nigromarginata, Aplysia 1818 : 375; 1826 : 43 (n° 97). « Dans les fucus ».
= *Aplysia punctata* Cuvier, 1803, Aplysiidae
= *A. rosea* Rathke, 1799; ce dernier a été placé dans l'Index officiel des noms zoologiques rejetés ou invalides (Opinion 355, *Bull. zool. Nomencl.*, 11 : 91-102, 1955), selon Pruvot-Fol, (1954) et Eales (1960). Matériel type présumé perdu.

NISO 1826 : 218.
= *Niso* Risso, 1826, Eulimidae. Type (par monotypie) : *N. eburnea* Risso, 1826.

(*) **niso, Jaminia** 1826 : 92 (n° 214). « Fissures des rochers ».
= *Jaminia quadridens* (O.F. Müller, 1774), var., selon Caziot (1919). Dans la collection Risso du Muséum, il ne reste que l'étiquette originale (*Pupa niso*) du matériel type de cette espèce.

niso, Pupa : cf. niso, Jaminia.

* * **nitens, Mitra** 1826 : 241 (n° 634). « Régions des algues ».
= *Mitra* (*Mitra*) *cornicula* (L., 1758), Mitridae. 2 syntypes dans la collection Risso du Muséum, mesurant 13 et 12 mm, et déjà révisés par Fischer-Piette et Beigbeder (1944). Ils ne correspondent pas à la dimension (16 mm) indiquée par Risso. Je désigne cependant le plus grand comme lectotype de *Mitra nitens* Risso, 1826.

* * **nitidissima, Arctoe** 1826 : 361 (n° 991), pl. 11, fig. 161; Ms : pl. 87 (ici : pl. 12, fig. 242). « Régions madréporiques ».
= *Dosinia lupinus* (L., 1758), Veneridae, comme l'ont admis plusieurs auteurs : 1 spécimen dans la collection Risso du Muséum, mesurant 17 × 16 mm, et que je désigne comme lectotype d'*A. nitidissima* Risso, 1826 (bien qu'il n'ait pas la dimension indiquée par Risso : 25 mm).

nitidula, Voluta 1826 : 249 (n° 660). « Régions coralligènes ».
Matériel type présumé perdu.

(†) * * **nodulosa, Alvania** 1826 : 141 (n° 351); Ms : pl. 16 (ici : pl. 8, fig. 59). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Alvania lineata* Risso, 1826, Rissoidae, car bien qu'*A. nodulosa* ait priorité de page, je choisis de maintenir le nom d'*Alvania lineata* Risso, 1826 (comme premier réviseur : ICZN article 24) en vue de favoriser la stabilité de la nomenclature de l'espèce. La collection Risso du Muséum contient 2 syntypes usés de 5 mm : je désigne l'un d'eux comme lectotype d'*A. nodulosa* Risso, 1826.

nodulosa, Lituites [1845] : 4
= *Nomen nudum*.

† **oblonga, Ammonites** 1826 : 13 (n° 28); Ms : pl. LII (ici : pl. 12, fig. 258). « Calcaire secondaire, Alpes maritimes ».
= Matériel type présumé perdu.

officinalis var. **lutea, Sepia** 1854 : 11.
= *Sepia officinalis* L., 1758, Sepiidae. Matériel type présumé perdu.

* **olivacea, Helicogena** 1826 : 63 (n° 136). « Vallons ombragés ».
= *Cepaea sylvatica* (Drap., 1805), Helicidae, selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 3 syntypes dans la collection Risso du Muséum, mesurant de 14 à 15 mm de hauteur.

olivacea, Nassa = cf. olivacea, Planaxis.

* * **olivacea, Planaxis** 1826 : 173 (n° 442), pl. 8, fig. 114; Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 104). « Bords rocailleux ».
= *Amycla corniculum* (Olivi, 1792), Nassariidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944), sous *Nassa olivacea*. 6 syntypes sont dans la collection Risso du Muséum : l'un mesurant 18 mm que je désigne comme lectotype de *P. olivacea* Risso, 1826. Ce n'est pas l'holotype, contrairement à ce qu'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder) et les 5 autres mesurant 17 à 13 mm (paralectotypes).

orbigni (sic), Murex : cf. orbignianus, Murex.

(†) * * **orbignianus, Murex** 1826 : 193 (n° 497); Ms : pl. 43 (ici : pl. 10, fig. 154) sous *M. orbigni*. « Régions rocailleuses (...). Se trouve subfossile ».
= *Ocenebra erinacea* (L., 1822), Muricidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1943) : la collection Risso du Muséum contient une coquille de 29,5 mm (différente de celle de la pl. Ms. 43) que ces auteurs quali-

fient à tort de paratype, et que je désigne comme lectotype de *Murex orbignianus* Risso, 1826.

ORBITINA 1826 : 82.
= *Rumina* Risso, 1826, Subulinidae.

ORIS 1826 : 57.
= ? Onchidiidae, genre douteux, selon Bourguignat d'après le matériel type d'*O. ferussaci* Risso, 1826 (espèce type du genre *Oris*, par monotypie). Ce matériel type est malheureusement présumé perdu.

OTAVIA Risso, 1826 : 132.
= (Non Cantraine, nec Gray, 1847) = *Clanculus* Montfort, 1810, Trochidae.

(†) **pairodoa** (sic), **Murex** 1826 : 195 (n° 503); Ms : pl. 46 ? (ici : pl. 10, fig. 164), sous *Ranella pairodoii*). « Région des algues (...). Se trouve subfossile ».
= Espèce dédiée à Payraudeau (!) et d'identification douteuse d'après la seule diagnose de Risso. Si c'est la même espèce que la *Ranella pairodoii* de la pl. Ms. 46 il s'agit de *Cymatium* (*Lampusia*) *corrugatum* (Lmk., 1816), Cymatiidae. Matériel type présumé perdu.

pairodoii (sic), Ranella : cf. pairodoa, Murex.

(†) **pallidula, Nerita** 1826 : 151 (n° 382), 271 (en note). « Régions sablonneuses (...). Se trouve subfossile ».
= *Smaragdia viridis* (L., 1766), Neritidae. Matériel type présumé perdu.

(†) * * **papillosa, Emarginula** 1826 : 260 (n° 691), pl. 10, fig. 147; Ms : pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 20 a). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Emarginula huzardi* Payr., 1826, Fissurellidae. 1 syntype de 11 mm en collection Risso du Muséum (qui peut être le spécimen mesuré par Risso : 12 mm) et que je désigne comme lectotype d'*E. papillosa* Risso, 1826. Cette identité du type de *papillosa* avec *huzardi* est tout à fait inattendue, *E. papillosa* étant une espèce qui a été admise comme bonne et caractéristique par tous les auteurs. Et ceci est d'autant plus surprenant qu'il existe dans la collection Risso *E. papillosa* Auct. mais étiquetée et décrite comme *Emarginula fissura* L. ! Compte tenu du résultat de la révision de son type, le nom d'*E. papillosa* Auct. (non Risso) doit être remplacé par son premier synonyme subjectif, c'est à dire *Emarginula adriatica* Costa, 1829.

† * * **parckinsonia, Arctoe** 1826 : 362 (n° 995), pl. Ms. 87 (ici : pl. 12, fig. 245), sous *A. parckinsonii*, « Fossile à la Trinité ».
= *Dosinia lupinus* (L., 1758), Veneridae. 1 valve de 13 mm (hauteur) sur 14 mm dans la collection Risso, étiquetée *Artemis parikinsonia* (sic), qui est probablement le spécimen mesuré par Risso (15 mm) : je la désigne comme lectotype d'*Arctoe parckinsonia* Risso.

parikinsonia (*sic*), Artemis : cf. parckinsonia, Arctoe.

† **patulus, Scaphander** 1826 : 51 (n° 111). « Terrains tertiaires de la Trinité ».
= *Scaphander*, spec. indét. Scaphandridae. Matériel type présumé perdu.

paucicostata, Mangelia 1826 : 221 (n° 580). « Régions coralligènes ».
Matériel type présumé perdu.

PEGEA 1826 : 88.
= *Proceruliana* Bourguignat, 1864, sous-genre de *Ferrussacia*, Ferrussaciidae, car j'ai constaté que *Pegea* Risso, 1826 était préoccupé par *Pegea* Savigny 1816 (Mém., p. 235) = *Salpa* Forskål, 1775. Le type de *Pegea* Risso (par monotypie) est *Pegea carnea* Risso, 1826.

pelagica, Gastrochena (*sic*) 1826 : 378 (n° 1038); Ms : pl. 82 (ici : pl. 12, fig. 234). « Tufs modernes calcarifères de grandes profondeurs ».
= *Gastrochaena dubia* (Penn., 1777), Gastrochaenidae, comme l'ont supposé plusieurs auteurs à la suite de Petit (1869) et comme le confirme la pl. Ms 82. Matériel type présumé perdu.

* **pelagica, Turritella** 1826 : 108 (n° 253); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 42). « Grandes profondeurs ».
= *Turritella pelagica* Risso, 1826, Turritellidae. 2 syntypes de 31 et 17 mm (Risso indique 22 mm) sont dans la collection Risso du Museum. A noter que certains auteurs (par exemple : Thiele, 1931) avaient fait de cette espèce de Risso un Epitoniidae du nom d'*Acirsa (Plesioacirsa) pelagica* Risso, 1826.

pellucida, Doris 1826 : 33 (n° 81). « Régions coralligènes ».
= *Cadlina pellucida* (Risso, 1826) = *C. clarae* von Ihering, 1880, Chromodoridiidae, selon Pruvot-Fol (1954). Matériel type présumé perdu.

pellucida, Eione : cf. pellucidus. Cyclope.

(†) **pellucidus, Cyclope** 1826 : 272 (n° 719); Ms : pl. 22 (ici : pl. 9, fig. 68) sous *Eione pellucida*. « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Cyclope pellucida* (Risso, 1826), Nassariidae, espèce admise par la plupart des auteurs. Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus (1882) y voyaient un synonyme de *Cyclope donovani* Risso, 1826. Malheureusement, le matériel type de *C. pellucidus* est présumé perdu, de même que celui de *C. donovani*.

† **pentagona, Lima** 1826 : 307 (n° 822); Ms : pl. 79 (ici : pl. 12, fig. 219). « Fossile dans le calcaire grossier de Contes et de Peglia ».
Matériel type présumé perdu.

perlatus, Loligopsis 1854 : 16, pl. 15, fig. 1-2 (le texte indique : pl. 18); Ms : pl. XV (= Risso 1854, pl. 15). « Région des galets ».
= *Chiroteuthis veranyi* (Fér., 1835), Chiroteuthidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

perlatus, Onychoteuthis 1854 : 37, pl. 14, fig. 1-2 (le texte indique : pl. 17); Ms : pl. XIV (= Risso 1854, pl. 14).
= *Chiroteuthis veranyi* (Fér. 1835), Chiroteuthidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

perna, Pinna 1826 : 310 (n° 830), pl. 11, fig. 159; Ms : pl. 80 (ici : pl. 12, fig. 232). « Pro-

fondeurs sablonneuses. J'ai trouvé cette espèce subfossile bien parfaite dans la brèche méditerranéenne du château de Nice ».
= (Non *Pinna pernula* Chemn., 1785). Pinnidae. Matériel type présumé perdu.

pharaonis corallina, Otavia : cf. corallina, Otavia.

PHORCUS 1826 : 133.
= *Phorcus* Risso, 1826, sous-genre de *Gibbula* Risso, 1826, Trochidae. Type : *Phorcus margaritaceus* Risso, 1826 = *Gibbula (Phorcus) richardi* Payr., 1826.

pilosellus, Pectunculus 1826 : 316 (n° 849). « Régions madréporiques ».
= *Glycymeris violascescens* (Lmk., 1819) juv., Glycymeridae, selon Monterosato (1892). Matériel type présumé perdu.

pilosus, Octopus 1826 : 4 (n° 5); 1854 : 65, pl. 25 (le texte indique : pl. 29, fig. 1; Ms : pl. XXVII (= Risso 1854, pl. 25). « Rochers peu profonds ».
= *Octopus vulgaris* Lmk., 1798, Octopodidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

pleyfelia (*sic*), **Saraphia,** 1826 : 84 (n° 190). « Endroits touffus et humides ».
Matériel type disparu de la collection Risso depuis très longtemps puisque ni Bourguignat (1861) ni Caziot (1919) ne l'ont trouvé. Bourguignat (1861) a souligné l'orthographe résolument fantaisiste du nom de cette espèce dédiée à Karl Pfeiffer !

(†) * * **plicatilis, Mangelia** 1826 : 220 (n° 573), pl. 7, fig. 97. « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Bela nebula* (Montagu, 1808), Turridae. 2 syntypes de 7 et 6 mm dans la collection Risso du Museum. Je désigne le plus grand (qui est peut être celui dont Risso indique la taille : 8 mm) comme lectotype de *M. plicatilis* Risso, 1826.

(†) * * **plicatula, Alvania** 1826 : 143 (n° 358), pl. 9, fig. 134; Ms : ? pl. 16 (ici : pl. 8, fig. 60) sous *Alvania plicatilis*. « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Turboella plicatula* (Risso, 1826), Rissoidae, bonne espèce reconnue par divers auteurs. Dans la collection Risso du Muséum, on trouve sous ce nom deux coquilles : l'une, mesurant 6 mm et à labre brisé, est ici désignée comme lectotype d'*Alvania plicatula* Risso, 1826; l'autre, mesurant 5 mm, appartient à une toute autre espèce de Rissoidae (il y a eu mélange).

[plicatula, Turbonilla « Risso » 1826 : 224 (n° 587), pl. 5, fig. 70; Ms : pl. 52 + 1 fig. dans « Figures diverses »].
= C'est *Turbo plicatulus* Brocchi, 1814, annexé par Risso ! Le type de Brocchi est perdu (Rossi-Ronchetti 1955 : 376), mais il s'agit bien d'un *Turbonilla* d'après diagnose et figure, et Monterosato (1884) a été jusqu'à considérer l'espèce de Brocchi comme un synonyme prioritaire de *Turbonilla pusilla* (Phil., 1844), ce qui est des plus douteux. Quant au matériel de Risso de cette espèce, il n'a pas été retrouvé.

[plicatula, Turritella « Risso » 1826 : 107 (n° 250)].
= C'est encore *Turbo plicatulus* Brocchi, 1814 qui est un *Turbonilla* (et non une espèce de Risso). Il est d'autant plus curieux que Risso en fasse une *Turritella* qu'il a lui-même créé le genre *Turbonilla* !

† **plicatulus, Cerithium** 1826 : 156 (n° 397); Ms : pl. 8 (ici : pl. 8, fig. 28). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

* * **plicatulus, Pecten** 1826 : 296 (n° 784). « Régions coralligènes ».
= *Chlamys flexuosa* (Poli, 1795), Pectinidae. 1 valve dans la collection Risso du Muséum, mesurant 16 (hauteur) × 17 mm, à côtes disposées par paires (ce que Tiberi a décrit comme var. *biradiata*) : je désigne cette valve (ayant la dimension qu'indique Risso) comme lectotype de *Pecten plicatulus* Risso, 1826. A noter que Risso se réfère à « Pol. XXVIII, 1, 2 » (= Poli 1792, vol. 2 : 159, pl. 28, fig. 1-2), c'est-à-dire à *Ostrea plica* L., espèce dont il a seulement modifié le nom pour en faire *plicatulus*.

(†) **poliana, Mangelia** 1826 : 221 (n° 577), pl. 8, fig. 103. « Régions sablonneuses (...). Se trouve subfossile ».
= *Rissoina bruguieri* (Payr., 1826), Rissoidae. Matériel type présumé perdu.

poligulata (*sic*), Helix : cf. folliculata, Helicella.

* **polita, Clausilia** 1826 : 87 (n °199), pl. 3, fig. 36. « Sous les pierres de nos collines ».
= *Granaria variabilis* (Drap., 1801), Pupidae, selon Chevallier (1976). Un syntype dans la collection Risso du Muséum, mesurant 20 mm de hauteur.

* * **polita, Patella** 1826 : 261 (n° 695). « Régions coralligènes ».
= La collection Risso contient 2 syntypes de 16 × 15 × 7 et 11 × 9 × 7 mm, coquilles épaisses et fortement usées (origine de leur nom) qui semblent référables à *Patella rustica* L., 1758 = *P. lusitanica* Gm., 1791, Patellidae. La seconde de ces coquilles correspond à la dimension indiquée par Risso, et je la désigne comme lectotype de *P. polita* Risso.

politum, Cardium 1826 : 333 (n° 900). « Régions coralligènes ».
= (Non *Cardium politum* Spengler, 1799) = ? *Cardium crassum* Gm., 1791, juv. (= *C. norvegicum* Spengl., 1799) selon Fischer-Piette (comm. pers.). Matériel type présumé perdu.

[polygonum, Buccinum « Risso » 1826 : 164 (n° 421); Ms : pl. 30].
= C'est le *Buccinum polygonum* Brocchi, 1814 : 344, pl. 5, fig. 10, annexé par Risso ! = *Phos polygonum* (Brocchi, 1814), Buccinidae, selon Rossi-Ronchetti (1955).

(†) **postdiluvianus, Conus** 1826 : 229 (n° 601); Ms : pl. 7 (ici : pl. 8, fig. 63b). « Subfossile ».
Matériel type présumé perdu.

(†) **postdiluvianus, Murex** 1826 : 196 (n° 507), pl. 7, fig. 96. « Subfossile à Grosueil ».
Matériel type présumé perdu.

* **prevostiana, Helicella** 1826 : 73 (n° 162). « Nos collines ».
= *Trichia* cf. *plebeia* (Drap., 1805), Helicidae selon Chevallier (1976) : 2 syntypes dans la collection Risso du Muséum, étiquetés *Helix prevostiana*. Bourguignat (1861) et Caziot (1919) y voyaient une variété fasciée d'*Helix hispida* L., 1758.

prevostiana, Helix : cf. prevostiana, Helicella.

(†) * * **provencalis, Fusus** 1826 : 207 (n° 537), pl. 9, fig. 131; Ms : pl. 48 (ici : pl. 10, fig. 170). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
[non *Fusus provincialis* Blainv., 1826 qui est *Fusinus rostratus* (Olivi, 1792); nec *F. provincialis* Fischer et Tournouer, 1873 = *Hadriana craticulata* Brocchi, 1814, Muricidae. 1 syntype de 30 mm (dimension citée par Risso) est dans la collection Risso du Muséum. Je le désigne comme lectotype du *Fusus provencalis*.

† **proxima, Cancellaria** 1826 : 187 (n° 479), pl. 6, fig. 84; Ms : pl. 51 (ici : pl. 10, fig. 178). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

† **proxima, Planaxis** 1826 : 179 (n° 461). « Fossile à Saint-Jean et à Magnan » [Nice].
= Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

(†) **proximum, Buccinum** 1826 : 160 (n° 410); Ms pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 85). « Subfossile ».
Matériel type présumé perdu.

* * **pulchella, Natica** 1826 : 148 (n° 373), pl. 4, fig. 42; Ms : pl. 24 (ici : pl. 9, fig. 70). « Régions coralligènes ».
= *Polinices pulchella* Risso, 1826, Naticidae, qui a priorité sur *Natica poliana* Delle Chiaje *in Poli* 1826, et sur *Natica alderi* Forbes, 1838. Dautzenberg et Dollfus (1883) supposaient déjà cette synonymie. Dans la collection Risso du Muséum on trouve 2 syntypes de 14 et 10 mm (Risso indique 12 mm). Je désigne le plus grand comme lectotype de *N. pulchella* Risso, 1826.

* **pulchella, Rissoa** 1826 : 121 (n° 290); Ms : pl. 14 (ici : pl. 8, fig. 51). « Régions sablonneuses ».
= ? *Rissoa auriscalpium* (L., 1766), Rissoidae. La collection Risso du Museum ne contient qu'une coquille incomplète et très usée (devenue presque lisse) laissant place au doute. Elle mesure 7 mm et peut être considérée comme un syntype (Risso indique 8 mm dans sa diagnose).

† **pulcherrimum, Buccinum** 1826 : 166 (n° 425); Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 86). « Fossile à Magnan [Nice] et à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

* * **pulcherrimus, Pecten** 1826 : 298, pl. 11, fig. 157 (n° 790); Ms : pl. 89 (ici : pl. 12, fig. 235). « Régions coralligènes ».
= *Propeamussium hyalinum* (Poli, 1795), Pectinidae, comme l'ont admis divers auteurs. La collection de Risso du Muséum contient une valve 21 (hauteur) × 28 mm et 2 paires de valves 17 × 20 et 17 × 19 mm. Je désigne comme lectotype de *Pecten pulcherrimus* Risso, 1826, la paire de valves 17 × 20 mm (qui correspond à la dimension qu'indique Risso : 20 mm).

[punctata, Arctoe « Risso » 1826 : 362 (n° 996); Ms : pl. 87].
= C'est *Mya punctatus* Allan, 1818 : 459 (tiré à part : 33), n° 4, pl. 9, fig. 5, comme le suggère Risso par sa référence « All., 33, 4, IX, 5″ et Risso a seulement changé de genre cette espèce.

[punctata, Nacca « Risso » 1826 : 148 (n° 375); Ms : pl. 29].
= C'est *Nerita punctata* Chemn., 1789, Naticidae, que Risso a seulement changée de genre = *Natica (Nacca) millepunctata* (Lmk., 1822). 2 coquilles de *Nacca punctata* sont dans la collection Risso du Muséum, mesurant 30 mm chacune.

punctata, Phasianella : cf. punctata, Tricolia.

* * **punctata, Tricolia** 1826 : 123 (n° 295); Ms : pl. 39 (ici : pl. 10, fig. 146), sous *Phasianella punctata*. « Régions des algues ».
= *Tricolia pulla* (L., 1767), Phasianellidae. 6 syntypes de 6 à 5 mm étiquetés *Phasianella punctata* var. *pulla*, dont un marqué « lectotype Robertson, 1962 » et dont 2, finement linéolés, sont référables à la var. *pulchella*, sont dans la collection Risso du Muséum.

[punctata, Voluta « Risso », 1826 : 250 (n° 662)].
= C'est *Voluta punctata* Allan, 1818, annexée par Risso qui donne cependant la référence d'Allan. Comme plusieurs auteurs l'ont supposé après Petit (1869), c'est bien un synonyme de *Pyrene rustica* (L., 1767), Pyrenidae (la figure d'Allan le confirme).

(†) (*) **punctulata, Mitra** 1826 : 245 (n °647); Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 9b) « Régions sablonneuses (...). Se trouve subfossile ».
= Comme l'ont signalé Fischer-Piette et Beigbeder (1944), la diagnose décrit *Vexillum (Pusia) tricolor* (Gm., 1791). [Non Montrouzier, 1861], alors que les 3 coquilles étiquetées *M. punctulata* dans la collection Risso du Muséum correspondent à *V. (P.) microzonias* (Lmk, 1811) exotiques (coquilles de 18 et 15 mm) et à *Mitra savignyi* Payr., 1826 (1 coquille de 8 mm) ! La dimension indiquée par Risso dans la diagnose est 5 mm; aucune de ces 3 coquilles ne paraît faire partie du matériel type.

purpurascens, Tellina 1826 : 347 (n° 941). « Régions coralligènes ».
Matériel type présumé perdu.

purpurea, Doris Risso *in* Guérin 1831 : 17, pl. 17. « Darse de Villefranche » [Villefranche-sur-Mer].
= *Chromodoris purpurea* (Risso, *in* Guérin, 1831), Chromodoridae. Cette bonne espèce de Risso a souvent été attribuée par erreur à Laurillard (auteur de la pl. 17) par exemple par Pruvot-Fol (1954), Haefelfinger (1969) et Schmekel (1972).

[purpurea, Mangelia « Risso » 1826 : 222 (n° 581)].

= C'est *Philbertia purpurea* (Montagu, 1803), Turridae, que Risso fait suivre de « N. » parce qu'il l'a changée de genre (Montagu la décrit comme *Murex purpureus*).

purpurea, Ovula : cf. purpurea, Simnia.

purpurea, Simnia 1826 : 235 (n° 618); Ms : pl. 33 (ici : pl. 9, fig. 114) sous *Ovula purpurea*. « Régions coralligènes profondes ».
= *Simnia purpurea* Risso, 1826, Ovulidae. L'espèce a été considérée par divers auteurs (par exemple Cate, 1971) comme synonyme de *S. nicaeensis* Risso, 1826 ; Giannini (1975) a retrouvé et figuré les deux taxons qui bien distincts. Matériel type présumé perdu.

(†) * * **purpureus, Turbo** 1826 : 116 (n° 280), pl. 4, fig. 48; Ms : pl. 13 (atypique) (ici : pl. 8, fig. 47). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= L'interprétation de cette espèce de Risso a fait l'objet des spéculations de nombreux auteurs qui ont vu en elle *Leptothyra sanguinea* L., 1766, *Gibbula turbinoides* (Desh., 1832) ou même *Littorina saxatilis* (Olivi). Il s'agit en fait d'une espèce bien différente = *Clanculus cruciatus* (L., 1766), Trochidae. 3 syntypes dans la collection Risso du Museum, mesurant 7, 5 et 4 mm (Risso indique 9 mm). Je désigne le syntype de 7 mm comme lectotype de *Turbo purpureus* Risso, 1826.

† **puticulus, Ostrea** 1826 : 290 (n° 765); Ms : pl. 71 (ici : pl. 11, fig. 215). « Fossile en montant à Villefranche » [Villefranche-sur-mer].
Matériel type présumé perdu.

* * **pygmaea, Gibbula** 1826 : 137 (n° 339); Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 142). « Régions coralligènes ».
= *Gibbula racketti* (Payr., 1826), Trochidae. 2 syntypes dans la collection Risso, mesurant tous les deux 6 mm (Risso indique 6 mm). Je désigne et étiquette l'un d'eux comme lectotype de *G. pygmaea* Risso.

† **pygmaeus, Nautilus** 1826 : 9 (n° 12); Ms : pl. XLVIII (ici : pl. 12, fig. 251). « Grès chlorité, Montalban » [= Mont Alban, Nice].
Matériel type présumé perdu.

(†) * * **pyramidata, Alvania** 1826 : 144 (n° 361). Ms : pl. 16 (ici : pl. 8, fig. 61). « Région des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Alvania (Turbona) cimex* (L., 1767), Rissoidae. La collection Risso du Muséum contient, sous ce nom, 2 syntypes de 5 et 6 mm : je désigne la seconde (ayant même dimension que celle indiquée par Risso dans la diagnose de l'espèce) comme lectotype d'*Alvania pyramidata* Risso, 1826.

(†) **pyramidata, Ranella** 1826 : 202 (n° 521); Ms : pl. 46 (ici : pl. 10, fig. 165). « Régions coralligènes » (...). Se trouve subfossile ».
= *Cymatium (Monoplex) parthenopeum* (von Salis, 1793), Cymatiidae, d'après la pl. Ms. 46. Matériel type présumé perdu.

quadriplicata, Volvaria 1826 : 233 (n° 612). « Régions madréporiques ».
Matériel type présumé perdu.

quinquelamellata, Jaminia 1826 : 91 (n° 210). « Sous les pierres de nos collines ».
= Selon Bourguignat (1861), c'est *Jaminia quinquedentata* (Born, 1778), Enidae. Risso se serait contenté de changer sans raison le nom spécifique donné par Born. Matériel type présumé perdu.

rabassin, Octopus 1854 : 67, pl. 26 (le texte indique : pl. 30, fig. 1); Ms : XXVIII (= Risso 1854, pl. 26). « Rochers profonds ».
= ? *Octopus rugosus* (Bosc, 1792), Octopodidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

(†) **rafinesquia, Purpura** 1826 : 167 (n° 430). Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 89), sous *P. rafinesquii*). « Subfossile ».
Matériel type présumé perdu.

* * **ramulosus, Murex** 1826 : 192 (n° 493); Ms : pl. 43 (ici : pl. 10, fig. 153). « Profondeurs madréporiques ».
= (Non *Murex ramosus* L.) = *Murex truncu-lus* L., 1822, Muricidae, comme le signalent Fischer-Piette et Beigbeder (1943). La collection Risso du Muséum contient un syntype de 22,5 mm (figuré pl. Ms. 43), que je désigne comme lectotype de *Murex ramulosus* Risso, 1826.

† **raricostata, Harpa** 1826 : 180 (n° 464); Ms : pl. 54 (ici : pl. 11, fig. 191). « Calcaire grossier de nos montagnes ».
Matériel type présumé perdu.

(†) **raricostata, Planaxis** 1826 : 174 (n° 444), pl. 8, fig. 106; Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 108). « Régions rocailleuses (...). Se trouve subfossile ».
= *Amycla corniculum* (Olivi, 1792) var., Nassariidae, comme plusieurs auteurs l'ont admis. Matériel type présumé perdu.

† **reinecki, Nautilus** 1826 : 10 (n° 17); Ms : pl. XXXIX (ici : pl. 12, fig. 248). « Calcaire tertiaire. Alpes maritimes ».
Matériel type présumé perdu.

* * **reinierius** (*sic*), **Trochus** 1826 : 128 (n° 312); Ms : pl. 35 (ici : pl. 9, fig. 122). « Régions coralligènes ».
= *Jujubinus exasperatus* (Pennant, 1777), Trochidae. La collection Risso du Muséum contient sous « *Trochus rineieria* » une coquille à apex brisé et dent columellaire aiguë (cf. ce qui a été appelé parfois variété *unidentatus* Phil., 1844) que je désigne comme lectotype de *Trochus renierius* Risso, 1826 (Risso écrit à tort Reinier et *reinierius* en 1826, et la pl. Ms. 35 indique *reinerius*...).

[reticulata, Alvania « Risso » 1826 : 144 (n° 360); Ms : pl. 16].
= C'est *Turbo reticulatus* Montagu, 1807 [maintenant : *Turbona reticulata* (Mont., 1807)], Rissoidae, changé de genre par Risso, mais les 4 coquilles de la collection Risso du Muséum étiquetées *A. reticulata* et mesurant 4 à 5 mm correspondent à *Alvania (Turbona) cimex* (L., 1767), Rissoidae.

* * **reticulata, Arca** 1826 : 311 (n° 834), pl. 12, fig. 171; Ms : pl. 68 (ici : pl. 12, fig. 222). « Rochers peu profonds ».

= (Non *Arca reticulata* Chemn., 1784, nec Turton, 1819) = *Arca lactea* L., 1758, Arcidae. 2 syntypes sont dans la collection Risso du Muséum, une paire de valves 10 × 5 mm et une valve 9 × 5 mm (Risso indique 8 mm). Je désigne la paire de valves comme lectotype d'*A. reticulata* Risso, 1826 (non Chemn., 1784 nec Turton, 1819).

[reticulata, Arctoe 1826 : 362 (n° 994)].
= C'est *Lucina reticulata* Poli, 1795 (souvent appelée *Jagonia reticulata*) Lucinidae, et non une espèce de Risso. 1 valve de 9 (hauteur) × 10 mm étiquetée « *Artemis reticulata* ».

reticulata, Artemis : cf. reticulata, Arctoe.

(†) **reticulata, Emarginula** 1824 = 359 (*nomen nudum* à cette date); 1826 : 260 (n° 690) : Ms : pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 20) sous *E. reticulina*. « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ». (Risso 1824) la cite du puits Risso à Grosueil, NW du Cap Ferrat).
= *Emarginula cancellata* Phil., 1836, Fissurellidae. Matériel type présumé perdu.

† **reticulata, Gibbula** 1826 : 138 (n° 342); Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 141). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

(†) **reticulata, Mangelia** 1826 : 220 (n° 574), pl. 8, fig. 102. « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Rissoina bruguieri* (Payr., 1826), Rissoidae, comme supposé par plusieurs auteurs à la suite de Scacchi (1836). Matériel type présumé perdu.

reticulata, Planaxis : cf. reticulata, Purpura.

[reticulata, Purpura 1826 : 167 (n° 429); Ms : pl. 32].
= C'est le *Buccinum reticulatum* Olivi, 1792 : 144, comme le suggère Risso par son renvoi à cette page. 5 coquilles dans la collection Risso, déjà signalées comme *Cantharus orbignyi* Payr., 1826 par Fischer-Piette et Beigbeder (1944) et étiquetées *Planaxis reticulata,* mais il ne s'agit pas de matériel type.

[reticulata, Venus « Risso » 1826 : 361 (n° 990); Ms : pl. 87.]
= (Non *Venus reticulata* L., 1767, nec *Venerupis reticulata* (Tenison-Woods, 1875). C'est *Jagonia reticulata* (Poli, 1795 sous *Lucina*) changée de genre par Risso, et qui a pour synonyme postérieur *Tellina tigerina* Allan, 1818 : 457 (tiré à part : 31), n° 4, pl. 9, fig. 11 (cité par Risso 1826 et synonyme selon une note Ms de lui sur une épreuve de la pl. 9 d'Allan : Ms. 2052).

[reticulatum, Cerithium 1826 : 157 (n° 401); Ms : pl. 8].
= C'est *Bittium reticulatum* (Da Costa, 1779), Cerithiidae, pour la diagnose de Risso mais pas pour la pl. Ms 8 qui figure *Triphora perversa* (L., 1758), Triphoridae ! Et en effet, sous *C. reticulatum* (comme c'est le cas sous *C. granulosum*) on trouve dans la collection Risso un mélange de *B. reticulatum* (2 coquilles) et de *T. perversa* (3 coquilles incomplètes ou brisées)...

* **reticulatus, Pectunculus** 1826 : 315 (n° 848), pl. 11; fig. 160. « Régions coralligènes ».
= *Glycymeris violacescens* (Lmk., 1819) juv., Glycymeridae; comme l'avait supposé Monterosato (1884). Dans la collection Risso du Muséum, on trouve une unique valve de 9 × 9 mm (alors que Risso indique 36 mm) qui est probablement un syntype.

reticulatus, Planorbis 1826 : 98 (n° 232). « Fossés aquatiques ».
= ? *Planorbis albus* O.F. Müller, 1774 selon Bourguignat (1861) qui signale déjà l'absence du matériel type de cette espèce dans la collection Risso.

reticulina, Emarginula : cf. reticulata, Emarginula

† **reticulina, Fissurella** 1826 : 258 (n° 685); Ms pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 18). « Fossiles à Magnan » [Nice].
= *Fissurella reticulata* (Da Costa, 1778), Fissurellidae, selon Christiaens (1974 b) qui attribue par erreur l'espèce *F. reticulina* à « Recluz 1826 » au lieu de « Risso 1826 ». Matériel type présumé perdu.

[rhomboïdes. Donax « Risso » 1826 : 340 (n° 919). « Régions madréporiques (...). Se trouve subfossile].
= Le cas de cette espèce, souvent attribuée à Risso, est particulièrement complexe. Risso se réfère à Poli, 81, XIX, 13, qui correspond à *Donax trunculus* L., 1758, ce qui a amené plusieurs auteurs à placer *D. rhomboïdes* Risso dans la synonymie de *D. trunculus* L., Donacidae. Mais Risso s'est très probablement trompé de référence p. 8 de Poli, car *Donax rhomboïdes* Poli, 1795 a pour référence : Poli 81, pl. XIV, fig. 16, pl. XV, fig. 12-13 et 16 et cette espèce de Poli est synonyme de *Hiatella arctica* (L., 1767), Hiatellidae. C'est en effet cette dernière espèce que Risso décrit, même si la paire de valves 29 × 20 mm qui existe dans la collection Risso du Muséum correspond à *Quadrans serrata* (Brocchi, 1814), Tellinidae par suite d'un mélange !

* * **richelmia, Patella** 1816 : 263 (n° 700). « Sur les rochers où suintent des sources d'eau douce dans la mer ».
= *Patella caerulea* L., 1758, Patellidae. 2 syntypes dans la collection Risso du Museum, mesurant 32 × 24 × 7 et 29 × 23 × 5 mm (dimensions diférentes de celle indiquée par Risso : 40 mm). Je désigne la plus grande comme lectotype de *Patella richelmia* Risso, 1826.

riparia, Nassa : cf. riparia, Planaxis.

(†) * * **riparia, Planaxis** 1826 : 175 (n° 450); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 111). « Bords rocailleux (...). Subfossile ».
= *Hinia costulata* (Renier, 1804) = *Nassa cuvieri* Payr., 1826, Nassariidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944) sous *Nassa riparia*. La collection Risso du Museum contient 7 coquilles de 9 à 11 mm : je désigne le plus grand de ces syntypes comme lectotype de *Planaxis riparia* Risso, 1826.

† **rolandius, Murex** 1826 : 201 (n° 519). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

rosacea, Nassa : cf. rosacea, Planaxis.

(†) * * **rosacea, Planaxis** 1826 : 176 (n° 453); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 100). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Hinia incrassata* (Müller, 1776), Nassariidae, comme indiqué par Fischer-Piette et Beigbeder (1944) : 2 syntypes de 11,5 et 11 mm (ce dernier figuré pl. Ms. 32 est ici désigné comme lectotype de *Pl. rosacea* Risso, 1826), dans la collection Risso du Muséum, et étiquetés « *Nassa rosacea* ».

rosalia, Vallonia 1826 : 102 (n° 237), pl. 3, fig. 30. « Lieux humides ».
= *Vallonia pulchella* O.F. Müller, 1774, Helicidae, selon Bourguignat (1861) et Caziot (1919). Matériel type présumé perdu. *Vallonia rosalia* est le type du genre *Vallonia* par monotypie.

rossiana, Nucula : cf. rossianus, Lembulus.

rossianus, Lembulus 1826 : 320, pl. 11, fig. 166 (n° 863); Ms : pl. 69 (ici : pl. 12, fig. 229) sous *Nucula rossiana.* « Grandes profondeurs ».
= *Nuculana* (*Lembulus*) *pella* (L., 1758), Nuculanidae, comme divers auteurs l'ont admis à la suite de Petit (1869). Matériel type présumé perdu.

rostrata, Nucula : cf. rostratus, Lembulus.

† **rostratus, Lembulus** 1826 : 320 (n° 864) : Ms : pl. 69 (ici : pl. 12, fig. 228) sous *Nucula rostrata.* « Fossile à la Trinité ».
= ? *Nuculana* (*Lembulus*) *fragilis* (Chemn., 1784), Nuculanidae, d'après la pl. Ms. 69. Matériel type présumé perdu.

rozeti, Loligo [1845] : 4.
= *Nomen nudum.*

* **rubella, Theba** 1826 : 75 (n° 169). « Nos champs ».
= *Euomphalia strigella* (Drap., 1801), Helicidae, selon Chevallier (1976) d'après l'unique syntype existant dans la collection Risso du Museum.

rubra, Doris 1818 : 369; 1826 : 31 (n° 75). « Sur les fucus ».
= *Rostanga rubra,* 1818 = *Doris rubra* Orb. (*de novo*) non *Doris rubra* Kelaart, 1858 = *Doris coccinea* Forbes, 1843, Rostangidae, selon Pruvot-Fol (1936 a, 1951, 1954). Matériel type présumé perdu.

rubra, Phasianella 1813 : 202.
= *Nomen nudum* pour *Tricolia rubra* Risso, 1826 (cf. cette entrée).

* * **rubra, Tricolia** 1826 : 122 (n° 293); Ms : pl. 39 (ici : pl. 10, fig. 147), sous *Phasianella rubra* (cf. cette entrée). « Régions coralligènes ».
= *Tricolia speciosa* (Megerle von Mühlfeld, 1824), comme divers auteurs l'ont supposé à la suite de Monterosato (1884). La collection Risso du Muséum contient 5 syntypes de 10,5 – 10 – 9,5 – 9 et 8,5 mm : je désigne le plus grand comme lectotype de *Tricolia rubra* Risso, 1826 (car Risso indique 11 mm dans sa diagnose).

(†) * * **rudis, Murex** 1826 : 193 (n° 498); Ms : pl. 43 (ici : pl. 10, fig. 151). « Anses abritées » (...). Se trouve subfossile ».
= *Ocenebra blainvillei* (Payr., 1826), Muricidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1943). 2 syntypes sont dans la collection Risso du Muséum : un de 18 mm (celui de la pl. Ms. 43 probablement : je le désigne comme lectotype de *M. rudis* Risso, 1826) et un de 11 mm.

rufus, Octopus 1845 : 4 (*nomen nudum* à cette date),; 1854 : 57, pl. 29 (le texte indique : pl. 26, fig. 1); Ms : pl. XXXI (= Risso 1854, pl. 29). « Rochers des moyennes profondeurs ».
= ? *Scaeurgus unicirrhus* (Fér. et Orb., 1835-1848), Octopodidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

[rugosa, Bolma 1826 : 117 (n° 281), pl. 4, fig. 51; Ms : pl. 13].
= C'est l'*Astraea* (*Bolma*) *rugosa* (L., 1766), Turbinidae que Risso s'attribue parce qu'il l'a changé de genre.

rugosa, Capsa 1826 : 351 (n° 955); Ms : pl. 85 (ici : pl. 12, fig. 246). « Régions coralligènes ».
= Matériel type présumé perdu.

† **rugulosa, Ammonites** 1826 : 12 (n° 22) : Ms : pl. LX (ici : pl. 12, fig. 256). « Calcaire marneux, Alpes maritimes ».
Matériel type présumé perdu.

rugulosa, Helix 1826 : 64 (n° 139). « Collines ».
= ? *Helix lactea* O.F. Müller, 1774, Helicidae, selon Bourguignat (1861). Matériel type présumé perdu.

† **rugulosa, Stomatia** 1826 : 253 (n° 671), pl. 10, fig. 148; Ms : pl. 40 (ici : pl. 10, fig. 145). « Fossile à la Trinité ».
= ? Trochidae. Matériel type présumé perdu.

RUMINA 1826 : 79.
= Addition proposée à l'Official List (*Bull. zool. Nomencl.,* 2 : 1958), avec *Helix decollata* L., 1758 comme espèce type. *Orbitina* Risso, 1826 est un synonyme.

* * **rupestris, Cerithium** 1826 : 154 (n° 389); Ms : pl. 8 (ici : pl. 8, fig. 24). « Profondeurs rocailleuses ».
= *Cerithium rupestre* Risso, 1826, Cerithiidae; non *C. rupestre* Auct. qui est *C. lividulum* Risso, 1826 (= *C. mediterraneum* Desh., 1843). L'unique spécimen de la collection Risso du Muséum mesure 27 mm (dimension indiquée par Risso dans sa diagnose) : je le désigne comme lectotype de *C. rupestris* Risso, 1826.

(†) * * **rupestris, Gibbula** 1826 : 136 (n° 334); Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 139). « Profondeurs rocailleuses (...). Se trouve subfossile ».
= *Clanculus cruciatus* (L., 1766), Trochidae. 5 syntypes étiquetés *Trochus rupestris* sont dans la collection Risso du Muséum. Ils mesurent de 9 à 7 mm. Je désigne comme lectotype de *G. rupestris* Risso, 1826, le plus grand syntype qui a la dimension qu'indique Risso.

rupestris, Trochus : cf. rupestris, Gibbula.

* **sabauda, Turritella** 1823 : 107 (n° 251); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 44). « Régions des algues ».

= *Turritella communis* Risso, 1826, Turritellidae. 1 syntype de 16 mm dans la collection Risso du Muséum.

SAGITTATUS 1854 : 29.
= *Ommastrephes* Orb., 1839 (= *Todarodes* Steenstrup, 1880), Ommastrephidae. Ce genre de Risso est inspiré de l'*O. sagittatus* (Lmk.).

* * **sanguinea, Gibbula** 1826 : 135 (n° 331); Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 135). « Régions des algues ».
= (Non *Trochus sanguineus* L., 1766 = *Gibbula ardens* (von Salis, 1793), Trochidae : 7 syntypes de 12 à 7 mm dans la collection Risso du Muséum, étiquetés « *Turbo sanguineus* » (Risso indiquant une taille de 12 mm, je désigne le plus grand syntype comme lectotype de *Gibbula sanguinea* Risso, 1826). Notons qu'un autre tube étiqueté *Turbo sanguineus* contient 5 coquilles du véritable *T. sanguineus* L., 1766, Turbinidae (= *Homalopoma sanguineum* L., 1766).

SARAPHIA 1826 : 83.
= *Carychium* O.F. Müller, 1774, Ellobiidae. A noter que sur les 5 espèces de *Saraphia* décrites par Risso (1826) une seule subsiste dans sa collection : *S. tridentata.*

sardea, Alvania 1826 : 145 (n° 366). « Se trouve subfossile ».
= ? *Alvania montagui* Payr., 1826, Rissoidae sur laquelle *Alvania discors* (Allan, 1818) a priorité (cf. entrée *A. discors*). Matériel type présumé perdu.

saussurea, Cassis 1826 : 182 (n° 469), pl. 6, fig. 83; Ms : pl. 55 (ici : pl. 11, fig. 185). « Terrains argileux de Magnan » [Nice].
= Matériel type présumé perdu.

sayea, Ferrussacia (sic) 1826 : 80 (n° 181). « Sur les pierres des collines ».
= *Ferrussacia follicula* (Lmk., 1822), Ferrussaciidae, selon Germain (1913). Matériel type présumé perdu.

[scaber, Cerithium « Risso » 1826 : 157 (n° 399); Ms : pl. 8].
= C'est *Murex scaber* Olivi, 1792 = *Bittium reticulatum* (Da Costa 1779), Cerithiidae. 4 coquilles dans la collection Risso.

scalaroïdes, Turritella 1826 : 107 (n° 252), 434 (sous *scalarioïdes*). « Régions coralligènes ».
= ? *Pyrgulina rufa* (Phil., 1836), Pyramidellidae, selon Monterosato (1885). Le matériel type est présumé perdu.

(†) * * **schroeterius, Gibbula** 1826 : 135 (n° 333); Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 138), sous *G. schroeteri*). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Clanculus jussieuii* (Payr., 1826), Trochidae. 5 syntypes de 7 à 9 mm étiquetés *Trochus schroeterius* dans la collection Risso du Muséum. Je désigne le plus grand (Risso indique 10 mm) comme lectotype de *Gibbula schroeterius* Risso, 1826.

schroeterius, Trochus : cf. schroeterius, Gibbula.

† **scilla, Cassidaria** 1826 : 185 (n° 476); Ms : pl. 54 (ici : pl. 11, fig. 183). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

SCYMNIA : cf. SIMNIA.

Semilunaris, Bisiphites : cf. semilunaris, Nautilus

† **semilunaris, Nautilus** 1826 : 10 (n° 15); Ms : pl. XLVIII (ici : pl. 12, fig. 254), sous *Bisiphites semilunaris.* « Calcaire tertiaire, Alpes maritimes ».
Matériel type présumé perdu.

* **septemdentata, Jaminia** 1826 : 91 (n° 211). « Bois du Var, lieux humides ».
= *Chondrina avenacea* (Brug., 1792), Clausiliidae, selon Bourguignat (1861) et les auteurs postérieurs. 2 syntypes dans la collection Risso du Muséum, étiquetés *Pupa septemdentata* et mesurant 6 mm de hauteur.

septemdentata, Pupa : cf. septemdentata, Jaminia.

(†) * **septemplicata, Volvaria** 1826 : 234 (n° 614); Ms : pl. 34 (ici : pl. 9, fig. 117). « Se trouve subfossile ».
= *Persicula miliaris* (L., 1766), Marginellidae. 4 syntypes de 5 à 4 mm dans la collection Risso du Muséum, déjà signalés par Fischer-Piette et Beigbeder (1944).

† **sepulta, Turritella** 1826 : 112 (n° 269); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 35). « Pétrifiée dans le Quadersandstein ».
Matériel type présumé perdu.

(†) **sexplicata, Volvaria** 1826 : 234 (n° 613); Ms : pl. 34 (ici : pl. 9, fig. 116). « Se trouve subfossile ».
= *Persicula miliaris* (L., 1766), Marginellidae. Matériel type présumé perdu.

signata, Mitra 1826 : 245 (n° 646). « Régions coralligènes ».
Matériel type présumé perdu.

SIMNIA (Leach Ms) Risso, 1826 : 235, et **SCYMNIA** 1826 : 438.
= *Simnia* (Leach Ms) Risso, 1826, Ovulidae. Type : *Simnia nicaeensis* Risso, 1826.

[sinuosa, Abra « Risso » 1826 : 370 (n° 1019)].
= C'est le *Mya sinuosa* Allan, 1818 : 459 (tiré à part 33), pl. 9, fig. 4, que Risso a seulement changé de genre.

solarium, Helicella 1826 : 70 (n° 152). « Collines et lieux agrestes ».
= *Helix terrestris* Pennant, 1777, Helicidae, selon Bourguignat (1861) ou *Helix elegans* Gm., 1791, Helicidae ? Matériel type présumé perdu.

† **solarium, Simplegas** 1826: 13 (n° 29). « Marne chloritée, Place Victor » [Nice].
Matériel type présumé perdu.

† **sowerbianus, Trochus** 1826 : 131 (n° 320); Ms : pl. 36 (ici : pl. 9, fig. 127). « Subpétrifiée dans l'argile chloritée ».
Matériel type présumé perdu.

SPEO 1826 : 235.
= (Non *Spea* comme l'écrit Petit, 1869) = *Actaeon* Montfort, 1810, Actaeonidae.

speo, Ancillaria : cf. *tornatilis, Speo.*

spinosa, Barnea 1826 : 376 (n° 1035); pl. Ms : pl. 83 (ici : pl. 12, fig. 234 a), sous [*Solemya*] *spinosa.* « Régions des fucus ».

= *Barnea candida* (L., 1758), Pholadidae, comme l'ont admis les auteurs à la suite de Petit (1869). Matériel type présumé perdu.

spinosa, [Solemya] : cf. spinosa, Barnea.

(†) **spinulosa, Pleurotoma** 1826 : 215 (n° 559); Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 197). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= Turridae. Matériel type présumé perdu.

† **spirale, Dentalium** 1826 : 401 (n° 13); Ms : pl. 46 (ici : pl. 10, fig. 169 a). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu. Ceci est très regrettable parce que l'espèce de Risso est particulièrement énigmatique. En effet sa diagnose, son nom et la figure de la pl. Ms 46 lui attribuent une ornementation spirale qui est totalement inconnue chez les Scaphopodes (aussi bien que chez les Serpulidae avec lesquels Risso aurait pu faire une confusion). Mais Risso n'a-t-il pas été trompé par une ornementation annulaire oblique ?

spiralis, Siliquaria 1826 : 115 (n° 227). « Régions coralligènes (...) débris subfossiles dans les sables quartiaires ».
Matériel type présumé perdu.

† **squamulatus, Murex** 1826 : 199 (n° 515); Ms : pl. 44 (ici : pl. 10, fig. 150). « Fossile à Magnan » [Nice].
= *Ocenebra* sp. Préoccupé par *Murex squamulatus* Brocchi, 1814, espèce bien différente qui est un *Trophonopsis*.

† **squamulosus, Pecten** 1826 : 301 (n° 802). « Fossile dans les galets de nos collines de l'Arquet et de Magnan » [Nice].
Matériel type présumé perdu.

(†) **stella, Patella** 1826 : 265 (n° 703), pl. 10, fig. 146. « Se trouve subfossile dans les terrains d'alluvions ».
= (Non *Patella stella* Lesson, 1831 = Acmaeidae) = *Patella ferruginea* Gm., 1791, Patellidae, selon Christiaens (1974a). Matériel type présumé perdu.

stellata, Aplysia 1818 : 375; 1826 (n° 98) : 43. « Sous les pierres ».
= *Aplysia punctata* Cuvier, 1803, Aplysiidae (= *A. rosea* Rathke, 1799, invalidé 1955 : cf. *nigromarginata, Aplysia*), selon Eales (1960). Matériel type présumé perdu.

stellatus, Pleurobranchus 1826 : 41 (n° 94). « Profondeurs coralligènes ».
= *Berthella stellata* (Risso, 1826), Pleurobranchidae. Espèce généralement admise comme comme bonne. Matériel type présumé perdu.

* **stomatellus, Sigaretus** 1826 : 252 (n° 667), pl. 10, fig. 152. « Sous les cailloux du rivage ».
= *Stomatella imbricata* Lmk., 1816, Trochidae d'Australie, et non une espèce de *Pleurobranchus,* de *Coriocella* ou de *Lamellaria* comme cela a été supposé successivement par divers auteurs ! La collection Risso du Muséum contient un unique syntype de 19 mm, étiqueté « *Sigaretus* » et « *Stomatica* Lam. *imbricata* P. » de ce Trochidae australien (alors que Risso indique 10 mm dans sa diagnose).

[striata, Bullina « Risso », 1826 : 52 (n° 113)].
= C'est en réalité *Bulla striata* Brug., 1789 et non une espèce nouvelle que signale ici Risso. Mais la référence qu'il cite (Broc. I, 8, 633 = Brocchi 1814 : pl. 1, fig. 8) étant celle de *Bulla ovulata* Lmk., rien ne prouve, du fait de la disparition du matériel de ce *Bullina striata* de la collection de Risso, que celui-ci ait réellement eu entre les mains l'espèce de Bruguière.

striatula, Turritella 1826 : 106 (n° 249), pl. 4, fig. 38; Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 41) et 1 fig. dans « figures diverses ». « Grandes profondeurs ».
= ? *Turritella communis* Riso, 1826, Turritellidae, selon Petit (1869) : Monterosato (1885) a au contraire admis l'espèce comme valable, mais dans les Pyramidellidae ! Le matériel type étant présumé perdu, ce problème ne peut être tranché.

† **striatus, Phorcus** 1826 : 134 (n° 329); Ms : pl. 37 (ici : pl. 9, fig. 130). « Fossile dans le vallon de Magnan » [Nice].
= ? *Monodonta mutabilis* (Phil., *in* Chemnitz, 1846), Trochidae, selon Monterosato (1884). Matériel type présumé perdu.

† **striolata, Cassis** 1826 : 182 (n° 470); Ms : pl. 55 (ici : pl. 11, fig. 188). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

(†) * **striolata, Mangelia** 1826 : 221 (n° 578), pl. 8, fig. 101. « Régions des coraux (...). Se trouve subfossile ».
= *Mangelia attenuata* (Montagu, 1808), Turridae, espèce type du genre *Mangelia* Risso, 1826. La coquille de 6 mm étiquetée *Mangelia striolata* dans la collection Risso du Muséum est une toute autre espèce résultant d'un mélange : *Rissoina bruguieri* (Payr., 1826).

† * * **striolata, Rissoa** 1826 : 119 (n° 284); Ms : pl. 14 (ici : pl. 8, fig. 52a). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Rissoa variabilis* (Megerle von Mühlfeld, 1824), Rissoidae. La collection Risso du Muséum contient 3 syntypes de 6 mm : je désigne l'un d'eux comme lectotype de *R. striolata* Risso, 1826 (Risso indique 7 mm comme dimension, dans sa diagnose).

† **striolata, Terebra** 1826 : 241 (n° 632), pl. 6, fig. 74; Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 11). « Fossile à Magnan » [Nice].
= Terebridae. Matériel type présumé perdu.

* **striolatum, Dentalium** 1826 : 398 (n° 3). « Régions madréporiques ».
= *Dentalium vulgare* Da Costa 1778, Dentaliidae. 8 coquilles dans la collection Risso du Muséum : 7 syntypes (le plus grand mesurant 45 mm de longueur et 4 mm de diamètre maximum) et un spécimen de *D. inaequicostatum* Dautz., 1891 résultant d'un mélange.

† **subalpina, Nerita** 1826 : 152 (n° 383), pl. 4, fig. 44. « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

subsulcatus, Bolomnites (sic) [1845] : 4.
= *Nomen nudum.*

(†) **succinctus, Murex** 1826 : 197 (n° 509), pl. 9; fig. 121 (Non Ms : pl. 43 = autre espèce; ici : pl. 10, fig. 157). « Se trouve subfossile ».
= *Cymatium (Monoplex) cutaceum* (L., 1799), Cymatiidae, d'après la fig. 121 (la pl. Ms 43 représente une toute autre espèce). Matériel type présumé perdu.

* **succinea, Calyptrea** 1826 : 256 (n° 679); Ms : pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 19). « Moyennes profondeurs ».
= *Calyptraea chinensis* (L., 1766), Calyptraeidae comme l'a supposé Petit (1869). 2 syntypes de 14 et 13 mm dans la collection Risso du Muséum (Risso indique 10 mm dans la diagnose de l'espèce).

succinea, Crepidula 1826 : 255 (n° 676); Ms : pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 14). « Sur le Triton méditerranéen ».
Matériel type présumé perdu.

* * **succineus, Pecten** 1826 : 297 (n° 789), pl. 11, fig. 153; Ms : pl. 89 (ici : pl. 12, fig. 236) sous *P. succinea*. « Régions des algues ».
= *Propeamussium hyalinum* (Poli, 1795), Pectinidae, comme cela a été supposé par divers auteurs à la suite de Petit (1869) : 3 syntypes sont dans la collection Risso du Muséum : une valve 20 × 22 mm, une paire de valves 17 × 19 mm, et une valve 13 × 14 mm. La paire de valves correspond à la dimension (18 mm) qu'indique Risso : je la désigne comme lectotype de *Pecten succineus* Risso, 1826.

† **sulcata, Ammonites** 1826 : 12 (n° 23); Ms : pl. LVIII (ici : pl. 12, fig. 259). « Calcaire marneux, Alpes maritimes ».
Matériel type présumé perdu.

† **sulcata, Ampularia** 1826 : 152 (n° 386). « Fossile à Contes ».
Matériel type présumé perdu.

† **sulcata, Cassis** 1826 : 181 (n° 466); Ms : pl. 55 (ici : pl. 11, fig. 189). « Fossile à la Trinité ».
Matériel type présumé perdu.

(†) * * **sulcata, Eione** 1826 : 172 (n° 439); Ms : pl. 22 (ici : pl. 9, fig. 67). « Subfossile dans nos terrains quartiaires ».
= *Hina costulata* (Reinier, 1804) = *Nassa cuvieri* Payr., 1826, Nassariidae. La collection Risso du Muséum contient 2 syntypes de 13 et 11 mm, étiquetés « *Nassa sulcata* ». Je désigne le plus petit comme lectotype d'*Eione sulcata* Risso, 1826 (car Risso indique 10 mm dans la diagnose de l'espèce).

† **sulcata, Gryphea** 1826 : 291 (n° 766); Ms : pl. 73 (ici : pl. 12, fig. 217). « Fossile dans le calcaire grossier de Contes ».
Matériel type présumé perdu.

† **sulcata, Pleurotoma** 1826 : 218 (n° 568). « Fossile à Saint-Jean, à Magnan » [Nice].
Matériel type présumé perdu.

sulcata, Spirulina [1845] : 4.
= *Nomen nudum.*

† **sulcatum, Isocardium** 1826 : 331 (n° 892); Ms : pl. 60 (ici : pl. 12, fig. 231). « Se trouve fossile dans le calcaire grossier de Contes et de Peglia ».
= *Glossus* sp., Glossidae. Matériel type présumé perdu.

sulcatum, Tritonium 1826 : 204 (n° 527). « Régions profondes ».
= Synonyme probable de *Charonia seguenzae* (Aradas et Benoit, 1870), Cymatiidae, nom d'espèce sur lequel celui donné par Risso aurait priorité. Mais le matériel type est présumé perdu.

(†) * **sulcatus, Lepidopleurus** 1826 : 268 (n° 713). « Se trouve subfossile (...). Sous les cailloux du littoral ».
= *Chiton olivaceus* Spengler, 1797, Chitonidae. 3 syntypes dans la collection Risso du Muséum, conservés à sec et mesurant 13 mm, 11 mm et une longueur indéterminable, le troisième spécimen étant brisé. Risso indique 25 mm pour cette espèce et donne comme référence Poli 8, III, 21 (= 1792, vol. 1 : 8, pl. 3, fig. 21), c'est-à-dire *Chiton squamosus* L.

† **sulcatus, Lituites** 1826 : 10 (n° 18). « Grès secondaire, Saint-Hospice » [= presqu'île du St-Hospice, Cap Ferrat].
Matériel type présumé perdu.

sulcatus, Modiolus 1826 : 324 (n° 875); Ms : pl. 68 (ici : pl. 12, fig. 221). « Régions profondes ».
= (Non Lmk. 1805 : *Modiolus micropterus* Desh., 1836; nec Lmk. 1819 : *Brachydontes citrinus* (Chemn.) = *Gregariella barbatella* (Cantr., 1835), Mytilidae. Matériel type présumé perdu.

† **sulcatus, Nautilus** 1826 : 10 (n° 16); Ms : pl. XLII (ici : pl. 12, fig. 252). « Calcaire tertiaire. Alpes maritimes ».
Matériel type présumé perdu.

sulcatus, Trochus 1813 : 201.
= *Nomen nudum.* C'est le nom publié par Brocchi l'année suivante pour une espèce qui, selon Rossi-Ronchetti (1952), qui en a revu le type, est le *Diloma (Oxystele) convexodepressa* (Cocco).

sulculata, Jaminia 1826 : 90 (n° 207). « Collines environnantes ».
= Pupidae indét., selon Bourguignat (1861) qui indique « échantillons brisés, indéterminables ». Matériel type présumé perdu.

sulculata, Nucula : cf. sulculatus, Lembulus.

† **sulculatus, Belemnites** 1826 : 14 (n° 31). « Calcaires marneux, Alpes maritimes ».
= Matériel type présumé perdu.

sulculatus, Lembulus 1826 : 320 (n° 862); Ms : pl. 69 (ici : pl. 12, fig. 229a) sous *Nucula sulculata*. « Grandes profondeurs ».
= (Non *Nucula sulcata* Bronn, 1831), ? *Nuculana (Lembulus) fragilis* (Chemn., 1784, Nuculanidae. Matériel type présumé perdu.

(†) * * **sulzeriana, Alvania** 1826 : 145 (n° 365), pl. 9, fig. 124; Ms : pl. 16 (ici : pl. 8, fig. 62). « Se trouve subfossile ».
= *Alvania* cf. *lanciae* (Calc., 1841), Rissoidae. La collection Risso du Muséum contient 2 syntypes de 6 et 5 mm. Je désigne cette dernière (ayant la dimension indiquée par Risso dans la diagnose) comme lectotype d'*A. sulzeriana* Risso, 1826.

(†) †** **suturale, Cerithium** 1826 : 158 (n° 402); Ms : pl. 8 (ici : pl. 8, fig. 26). « Se trouve subfossile et fossile ».
= *Bittium reticulatum* (Da Costa, 1779), Cerithiidae. D'ailleurs Risso se réfère à Brocchi, 1814 : 448, n° 76, pl. 9, fig. 17, c'est-à-dire à *Murex scaber* Olivi, 1792 (synonyme de *B. reticulatum*), espèce à laquelle il donne inutilement un nouveau nom. La collection Risso du Muséum contient 2 syntypes de 14 et 13 mm; je désigne le plus grand (ayant la dimension indiquée par Risso dans la diagnose) comme lectotype de *Cerithium suturale* Risso, 1826.

TARAS 1826 : 344.
= Pelecypoda, *nomen dubium*, comme l'indique Vokes (1967). Type (par monotypie) : *Taras antiquatus* Risso, 1826.

† **targionus, Scaphander** 1826 : 51 (n° 110), pl. 2, fig. 13. « Fossile dans les terrains tertiaires de la Trinité ».
= *Scaphander lignarius* (L., 1758), Scaphandridae, variété fossile, comme l'ont admis Cantraine (1840) et Monterosato (1884). Matériel type présumé perdu.

* **tenuis, Cochlicella** 1826 : 77 (n° 174). « Prairies ».
= *Cochlicella ventricosa* (Drap., 1801), Helicidae, selon Bourguignat (1861) et Chevallier (1976). 2 syntypes dans la collection Risso du Muséum.

(†) * * **tenuis, Planaxis** 1826 : 174 (n° 447), pl. 8, fig. 104; Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 98). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= *Hinia costulata* (Renier, 1804) = *Nassa cuvieri* Payr., 1826, Nassariidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944). La collection Risso du Muséum contient un syntype de 11 mm, que je désigne comme lectotype de *P. tenuis* Risso, 1826 (Risso indique 12 mm dans sa diagnose).

[tenuis, Trochus « Risso » 1826 : 129 (n° 314); Ms : pl. 35. « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= C'est *Trochus tenuis* Montagu, 1803, abusivement annexé par Risso = *Calliostoma granulatum* (Born, 1778), Trochidae. 1 coquille de 24 mm dans la collection Risso.

TERGIPES 1818 : 372.
= Genre inscrit (sous le n° 1795) dans l'Official Index of rejected or invalid generic names in Zoology (Opinion 773. *Bull. zool. Nomencl.*, 23 : 84, 1966) et considéré comme synonyme junior de *Tergipes* Cuvier, 1805 qui est au contraire validé et choisi comme genre type des Tergipedinae.

† **tertiarius, Capulus** 1826 : 254 (n° 674), pl. 10, fig. 149; Ms : pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 12). « Fossile à Saint-Jean ».
= Capulidae. Matériel type présumé perdu.

tertiarius, Loligo 1854 : 27, pl. 11, fig. 1-2 (il existe 2 pl. 11). « Marnes calcaires, vallon de Magnan » [Nice].
= Test incomplet de Ptéropode (comme le montre clairement la pl. 11, fig. 1-2) pris par Risso pour un bec de calmar, conformément à la supposition d'Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

testudinaria, Doris 1818 : 370; 1826 : 33 (n° 82), pl. 2 fig. 15. « Dans les pierres ».
= (Non *Doris testudinaria* Alder et Hancock, 1862). Selon Pruvot Fol (1936a), Risso « a confondu au moins deux espèces, et la figure ne représente pas celle que décrit la diagnose ». Aussi, selon les auteurs, c'est un synonyme junior d'*Archidoris tuberculata* (Cuvier, 1804), un synonyme senior de *Discodoris planata* (Alder et Hancock, 1846) [= *A. stellifera* Vayss., 1904], ou une espèce indéterminable ! Matériel type présumé perdu.

THEBA (Leach Ms) Risso, 1826 : 73.
= *Theba* (Leach Ms) Risso, 1826, Helicidae (= *Teba* Leach, 1852 : voir à ce sujet l'avant dernière note infrapaginale de l'introduction au présent travail). Générotype : *H. pisana* O.F. Müller, 1774 (désigné par Gray, 1847). A noter que trois des espèces nouvelles de *Theba* décrites par Risso appartiennent en réalité à d'autres genres : *T. rubella* et *T. charpentieri* se rattachent à *Euomphalia* et *T. meridionalis* à *Eobania*. *Theba* Risso 1826 est inscrit dans l'Official List (Nom N°. 1027).

(†) * **theresa, Fidelis** 1826 : 121 (n° 291), pl. 5, fig. 59; Ms : 1 figure dans « Figures diverses, sous *Fidella theresa*. « Régions sablonneuses (...). Se trouve subfossile ».
= *Truncatella subcylindrica* (L., 1766), juv., Truncatelidae, comme le supposait déjà Petit (1869). La collection Risso du Muséum contient 2 syntypes de moins de 3 mm, étiquetés *Fidella Evesa*. Il est intéressant de souligner que, sans le dire, Risso a dédié le genre et l'espèce à sa mère, née Teresa Fidella (il est d'ailleurs évident par ce qui précède, qu'il a hésité sur l'orthographe à adopter : respecter l'orthographe italienne ou latiniser).

timida, Elysia 1826 : 45 (n° 101), pl. 1, fig. 3-4 : cf. timidus, Notarchus 1818.

timidus, Notarchus 1818 : 376; 1826 (sous *Elysia timida*) : 45 (n° 101), pl. 1, fig. 3-4. « Sous les pierres ».
= *Elysia timida* (Risso, 1818), Elysiadae (et non 1826 comme l'indique Pruvot-Fol, 1954). Matériel type présumé perdu.

[tornatilis, Speo « Risso » 1826 : 236 (n° 620), pl. 8, fig. 109; Ms : pl. 34 (sous *Ancillaria speo* !)].
= C'est évidemment *Actaeon tornatilis* (L., 1767), Actaeonidae, et non une espèce de Risso.

[triangularis, Murex « Risso » 1826 : 196 (n° 505)].
= Il s'agit du *Murex triangularis* Allan, 1818 : 462 (tiré à part : 36), pl. 9, fig. 18, que Risso annexe abusivement. La localité type indiquée par Allan est la péninsule du St-Hospice [Cap Ferrat].

TRICOLIA 1826 : 122.
= *Tricolia* Risso, 1826, Phasianelidae. Type : *Turbo pullus* L., 1766.

(†) * **tricolor, Pleurotoma** 1826 : 215 (n° 558); Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 192). « Se trouve subfossile ».

= *Philbertia linearis* (Montagu, 1803), Turridae, comme le supposait Monterosato (1884). 2 syntypes de 8 mm dans la collection Risso du Muséum.

(†) * * **tricolor, Rissoa** 1826 : 120 (n° 287); Ms : pl. 14 (ici : pl. 8, fig. 52). « Région des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Rissoa violacea* Desm., 1814, Rissoidae : 2 syntypes de 3 mm dans la collection Risso du Muséum (dimension qu'indique Risso dans sa diagnose), dont un que je désigne comme lectotype de *R. tricolor* Risso, 1826. Un *Alvania (Turbona) cimex* (L., 1767) est mêlé aux 2 syntypes.

(†) * **tricolor, Trochus** 1813 : 201 (*nomen nudum* à cette date); 1826 : 127 (n° 306), pl. 9, fig. 135; Ms : pl. 35 (ici : pl. 9, fig. 123). « Régions des algues ». (Risso, 1813 indique le puits à Grosueil, NW du Cap Ferrat).
= *Jujubinus exasperatus* (Penn., 1777), Trochidae, comme le supposait déjà Petit (1869). 5 syntypes dans la collection Risso du Muséum, mesurant 12 à 8 mm.

(†) **tricolor, Turbo** 1824 : 260 (*nomen nudum* à cette date); 1826 : 116 (n° 279); Ms : pl. 13 (ici : pl. 8, fig. 46). « Rochers du rivage (...). Se trouve subfossile » (Risso 1824 indique le puits Risso à Grosueil, NW du Cap Ferrat).
= *Melaraphe neritoides* (L., 1766), Littorinidae, Risso (Ms 2052, Systématique a, p. 167) indique que son espèce est le *Litorina* (sic) *basteroti* Payr. 1826, qui est bien un synonyme de *M. neritoides*. Matériel type présumé perdu.

tridentata, Saraphia 1826 : 84 (n° 191). « Prairies et fossés aquatiques ».
= *Carychium tridentatum* (Risso, 1826), Ellobiidae. Selon Bourguignat (1861) et Caziot (1919). Le matériel type est présumé perdu, mais il a été illustré par Bourguignat (1861 : fig. 27-28).

* **trifasciata, Donax** 1826 : 340 (n° 922). « Régions des algues ».
= *Donax semistriatus* Poli, 1795, Donacidae, comme l'avait supposé Monterosato (1884). 2 syntypes sont en collection Risso au Muséum : 1 paire de valves 15 × 8 mm et 1 valve 15 × 8 mm, ne correspondant pas à la dimension qu'indique Risso (12 mm).

[trifasciata, Planaxis « Risso » 1826 : 174 (n° 446); Non Ms : pl. 32].
= Comme le suggère la référence de Risso (« Linn. Gm. 3439, 77 ») = il s'agit du *Buccinum trifasciatum* Gm., 1790, changé de genre par Risso. C'est donc à tort que Fischer-Piette et Beigbeder (1944) ont considéré comme matériel type les 5 coquilles (de 15 à 17 mm) contenues dans la collection Risso du Muséum; comme ils l'indiquent, il s'agit là de 5 spécimens d'*Amycla corniculum* (Olivi, 1792), Nassariidae.

trilamillata, Jaminia 1826 : 91 (n° 208). « Sous les pierres des collines ».
Le matériel type manquait déjà en 1861, selon Bourguignat; il est présumé perdu.

trilaminata (*sic*), Turbinella : cf. bilamillata, Turbinella.

[trinitea, Mactrula « Risso » 1826 : 369 (n° 1015), pl. 12, fig. 169].
= C'est *Mya trinitea* Allan, 1818 : 546 (tiré à part : 30), 459, n° 2, pl. 9 (et non 11 !), fig. 3, comme l'indique Risso lui-même qui a seulement changé cette espèce de genre. Manque dans la collection Risso du Muséum.

[triplicata, Turbinella « Risso » 1826 : 212 (n° 552), pl. 8, fig. 110; Ms : pl. 53].
= C'est *Murex triplicata* Allan, 1818 : 462 (tiré à part : 36), pl. 9, fig. 19, espèce annexé par Risso ! Une note Ms de Risso sur l'épreuve de la pl. 9 d'Allan (Ms 2052) confirme cette identité. La collection Risso contient 1 coquille de cette espèce, qui est bien, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944), *Vexillum (Pusia) ebenus* (Lmk., 1811), Mitridae, mais qui n'est pas un type (ni un holotype) puisque l'espèce est d'Allan, 1818 !

(†) * * **triquetra, Murex** 1826 : 195 (n° 502); Ms : 43 (ici : pl. 10, fig. 156). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Ocenebra erinacea* (L., 1822), Muricidae, comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder (1944). La collection Risso du Muséum contient 2 syntypes de 38 et 36 mm que ces auteurs désignent comme type et paratype, et qui sont plus exactement le lectotype et le paralectotype.

tritentaculatus, Octopus 1845 : 4 (*nomen nudum* à cette date; 1854 : 63. « Moyennes profondeurs ».
= ? *Scaeurgus unicirrhus* (Fér. et Orb., 1835-1848), Octopodidae, selon Adam 1942. Matériel type présumé perdu.

TRITIA 1826 : 172 (note 1).
= *Hinia* (Leach Ms) Gray 1847 *(pro parte)*, Nassariidae. Nom du genre que Risso avait pensé créer pour diverses espèces qu'il a finalement rangées sous *Planaxis*. Ce genre *Tritia*, accepté par H. et A. Adams est inutilisable parce que composite.

TRUNCATELLA 1826 : 124.
= *Truncatella* Risso, 1826, Truncatellidae. Type *T. laevigata* Risso, 1826 (désigné par Woodward 1854 : 137). Genre inscrit dans l'Official List (sous le N°. 858). Risso a créé inutilement un autre genre *(Fidelis)*, basé sur les jeunes de *T. subcylindrica*.

truncatella, Orbitina 1826 : 82 (n° 185), pl. 3, fig. 25. « Fissures des rochers, des collines arides ».
= *Rumina decollata* (L., 1758) juv., Subulinidae, selon Cantraine (1840) et Caziot (1919). Matériel type présumé perdu.

† **tuberculata, Cassidaria** 1826 : 186 (n° 477); Ms : pl. 54 (ici : pl. 11, fig. 182). « Fossile à Magnan » [Nice].
Matériel type présumé perdu.

† **tuberculata, Gibbula** 1826 : 138 (n° 343); Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 137). « Subpétrifié dans le grès chlorité ».
Matériel type présumé perdu.

(†) * **tuberculata, Ranella** 1826 : 203 (n° 524), pl. 9, fig. 123; Ms : pl. 46 (ici : pl. 10, fig. 167). « Régions des algues (...). Se trouve subfossile ».
= *Cymatium (Cabestana) cutaceum* (L., 1799), Cymatiidae. Une note manuscrite de Fischer-Piette dans la collection Risso du Muséum indique « Non retrouvé, mais un *Ranella gigantea* Lmk. porte par erreur l'étiquette *R. tuberculata* Risso ». Le matériel type est présumé perdu.

(†) **tuberculatum, Buccinum** 1826 : 160; Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 81). « Se trouve subfossile ».
= Nassariidae. Matériel type présumé perdu.

[tuberculatus, Octopus « Risso » 1826 : 3 (n° 4); 1854 : 71].
= C'est en réalité *Octopus tuberculatus* Rafin. 1814. = *Ocythoe tuberculata* (Rafin, 1814).

[tuberculatus, Trochus « Risso » 1826 : 128 (n° 310), pl. 9, fig. 133; Ms : pl. 35].
= Risso a très probablement cru reconnaître *Trochus tuberculatus* Da Costa, 1779 [qui est *Gibbula magus* (L., 1766), Trochidae], alors qu'il s'agissait de *Gibbula fanulum* (Gm., 1790), Trochidae, comme le montre l'unique coquille, de 14 mm, étiquetée *T. tuberculatus* dans la collection Risso.

(†) **tuberosus, Trochus** 1826 : 131 (n° 319); Ms : pl. 36 (ici : pl. 9, fig. 128). « Fossile dans le calcaire grossier. Vallée de Contes ».
= *Incertae sedis*. Matériel type présumé perdu.

tubulatus (sic), Bolomnites (sic) : cf. tubulosus, Belemnites.

† **tubulosus, Belemnites** 1826 : 14 (n° 33); 1845 : 4, cité sous *Bolomnites tubulatus* (sic). « Grès chlorité, Roccatagliada ».
Matériel type présumé perdu.

* * **tumida, Scalaria** 1826 : 112 (n° 271); Ms : pl. 12 (ici : pl. 8, fig. 31). « Régions corralligènes ».
= *Cirsotrema (Gyroscala) commutatum* (Monterosato, 1877), Epitoniidae : 1 syntype de 23 mm dans la collection Risso du Muséum (Risso indique 26 mm); je le désigne comme lectotype de *S. tumida* Risso, 1826.

TURBONILLA (Leach Ms) Risso, 1826 : 224.
= *Turbonilla* (Leach Ms) Risso, 1826, Pyramidellidae (= *Turbonella* Leach, 1852 : 163). Type : *Turbo lacteus* L., 1766.

turricula, Cochlicella 1826 : 78 (n° 176). « Lieux arides ».
= *Cochlicella acuta* (Müller, 1774), Helicidae, comme Risso lui-même le suggère par ses deux renvois à Draparnaud et Férussac. Le nom de *turricula* est un nouveau nom injustifié pour l'espèce de Müller. Matériel type présumé perdu.

(†) * * **turtonia, Patella** 1826 : 266 (n° 706). « Subfossile ».
= *Patella ferruginea* Gm., 1791, Patellidae. 1 syntype dans la collection Risso du Museum, mesurant 35 × 30 × 12 mm. Ces dimensions se comparent difficilement à celles indiquées par Risso : 35 × 26 × 22 mm. Cependant il indique bien (Ms. 2052, systématique a, p. 157) que son espèce est synonyme de *P. lamarckii* Payr., 1826 (reconnu maintenant comme synonyme de *P. ferruginea*). Je désigne donc l'unique syntype comme lectotype de *Patella turtonia* Risso, 1826.

(†) * * **turulosa, Planaxis** 1826 : 174 (n° 445), pl. 8, fig. 108 : Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 102). « Régions madréporiques » (...). Se trouve subfossile ».
= Comme le suggéraient Fischer-Piette et Beigbeder (1944), cette espèce est bonne : *Hinia turulosa* (Risso, 1826), Rissoidae, et a pour synonyme *Nassarius edwardsi* P. Fischer, 1882, sur laquelle elle a priorité. La collection Risso du Muséum contient un syntype de 10,5 mm qui n'est pas un holotype (contrairement à ce qu'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder, 1944), mais que je désigne comme lectotype de *P. turulosa* Risso, 1826.

(†) * * **ulvae, Monodonta** 1826 : 132 (n° 325). « Se trouve subfossile ».
= *Monodonta articulata* (Lmk., 1822), Trochidae, comme l'avait admis Monterosato (1884). 3 syntypes en collection Risso du Muséum, étiquetés *Turbo ulvae* et mesurant 20, 20 et 16 mm. Je désigne l'un des deux syntypes de 20 mm (dimension indiquée par Risso) comme lectotype de *Monodonta ulvae* Risso, 1826.

ulvae, Turbo : cf. ulvae, Monodonta.

(†) **undulata, Mangelia** 1826 : 221 (n° 579); Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 203). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ».
= Turridae. Matériel type présumé perdu.

(†) **undulatus, Trochus** 1813 : 201 (nomen nudum); 1826 : 130 (n° 316). « Régions coralligènes (...). Se trouve subfossile ». Risso (1813) cite l'espèce du puits Risso à Grosueil.
= *Gibbula fanulum* (Gm., 1790), Trochidae. Matériel type présumé perdu. Risso se réfère à « Allan, 1818, 36, XII, 10, 9 [= Allan 1818 = 462 (tiré à part : 36), n° 12, pl. 10, fig. 6 (et non fig. 9)] ce qui correspond à *Turbo torosus* Allan, 1818 qui est sans aucun doute *G. fanulum*.

† **undulosus, Pecten** 1826 : 300 (n° 800). « Fossile à St. Jean ».
Matériel type présumé perdu.

unicolor, Aplysia Risso 1818 : 374. « Dans les algues ».
= *Aplysia punctata* Cuvier, 1803, Aplysiidae (= *A. rosea* Rathke, 1799, invalidé 1955 : cf. entrée *nigromarginata, Aplysia*), selon Eales (1960). Matériel type présumé perdu.

unidentata, Saraphia 1826 : 84 (n° 188). « Endroits humides ».
Matériel type signalé manquant dans la collection Risso dès 1861 (Bourguignat), et présumé perdu.

unifasciata, Nanina 1826 : 150 (n° 380), pl. 5, fig. 61; Ms : pl. 29 (ici : pl. 9, fig. 73). « Régions vaseuses ».
= *Cyclope neritea* (L., 1767), Nassariidae, juv. C'est le type (par monotypie) du genre *Nanina* Risso, synonyme de *Cyclope* Risso, 1826. Matériel type présumé perdu.

uniplicata, Saraphia 1826 : 83 (n° 187). « Fossés aquatiques ».
Matériel type disparu précocement de la collection Risso (Bourguignat 1861) et présumé perdu.

† **uniplicata, Turritella** 1826 : 110 (n° 263); Ms : pl. 11 (ici : pl. 8, fig. 45). « Saint-Jean, à la Trinité ».
=Turritellidae. Matériel type présumé perdu.

uniplicatum, Buccinum 1826 : 158 (n° 404); Ms : pl. 30 (ici : pl. 9, fig. 83). « Régions des algues ».
Matériel type présumé perdu.

urceolatus, Loligo 1845 : 4 (*nomen nudum* à cette date); 1854 : 25, pl. 14, fig. 1-4 (le texte indique : pl. 9, fig. 1-4); Ms : pl. X (= Risso 1854, pl. 14). « Régions des algues ».
= *Alloteuthis media* (L., 1758, Loliginidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

urtica, Phallusia 1826 : 276, pl. 11, fig. 158. « Attaché aux pierres de moyenne profondeur ».
Comme le montrent la diagnose et la figure, il ne s'agit aucunement d'une Ascidie, comme le supposait Risso, mais d'une ponte de Gastropode Prosobranche (Buccinidae ?) ! Matériel type présumé perdu.

utingerian (*sic*), Rostellaria : cf. uttingerianus, Rostellaria.

† **uttingerianus, Rostellaria** 1826 : 225 (n° 591); Ms : pl. 1 (ici : pl. 8, fig. 2), sous *R. utingerian*). « Fossile à Magnan [Nice] et à la Rochette du Var ».
= *Aporrhais uttingeriana* (Risso, 1826), Aporrhaidae. Matériel type présumé perdu.

VALLONIA 1826 : 101.
=Addition proposée à l'Official List (*Bull. zool. Nomencl.*, 2 : 123, 1958) avec *V. rosalia* Risso, 1826 (= *Helix pulchella* O.F. Müller, 1774), Helicidae, comme génotype (par monotypie).

variabilis, Patella 1826 : 264 (n° 702). « Sur les rochers ».
= (Non *Patella variabilis* Krauss, 1848) *Patella* (*Patellastra*) *rustica* L., 1758, selon Christiaens (1974 a).

(*) **varians, Helicella** 1826 : 70 (n° 154). « Nos régions ».
= ? *Xerophila cespitum* (Drap., 1801), Helicidae, juv. blanchâtres, (selon Bourguignat 1861). Mais les spécimens actuellement dans la collection Risso du Muséum, sous le nom d'*Helix varians*, et déjà vus par Caziot (1919) ne correspondent pas à l'espèce de Risso (Chevallier, 1976).

varians, Helix : cf. varians, Helicella.

* **variegata, Gibbula** 1826 : 137 (n° 338). Ms : pl. 38 bis (ici : pl. 10, fig. 140). « Nos régions ».
= *Gibbula varia* (L., 1766), Trochidae, dont Risso a modifié le nom ! 3 syntypes étiquetés *Trochus variegata* dans la collection Risso du Muséum, et mesurant 7 à 5 mm.

(†) * * **variegata, Purpura** 1826 : 167 (n° 428); Ms : pl. 32 (ici : pl. 9, fig. 96). « Rochers du littoral (...). Se trouve subfossile ».
= *Pisania maculosa* (Lmk., 1822), Buccinidae comme l'indiquent Fischer-Piette et Beigbeder

---

PLANCHE 8

Reproduction des illustrations inédites de P. Gény (MNHN Paris : Ms 2052, pl. 1, 3-5, 7-8, 11-14 et 16-17) des mollusques de Risso.

Fig. 1. Rostellaria brongniartianus.
2. R. uttingerianus.
3. Strombus delucianus.
4. Mitra costulata.
5. M. buccinoidea.
6. M. borniana.
7. M. glabra.
7a. M. leonardiana.
8. M. adolphia.
9. M. ventricosa.
9a. M. biplicata.
9b. M. punctulata.
10. Voluta ancyloides.
11. Terebra striolata.
12. Capulus tertiarius.
13. C. vitreus.
14. Crepidula succinea
15. C. candida.
16. Fissurella defrancia.
17. F. mamillata.
18. F. reticulina.
19. Calyptrea succinea.
20. Emarginula reticulata.
20a. E. papillosa.
20b. E. depressa.
21. Cerithium magnan.
22. C. borsonianum.
23. C. assimile.
24. C. rupestris.
25. C. lividulum.
26. C. suturale.
27. C. mamillatum.
28. C. plicatulus.
29. C. bicinctus.
30. Scalaria muricata.
31. S. tumida.
32. S. elegans.
33. Turritella computensis.
34. T. cordieria.
35. T. sepulta.
36. T. georgina.
37. T. adansonia.
38. T. bruguiera.
39. T. bisulcata.
40. T. communis.
41. T. striatula.
42. T. pelagica.
43. T. inaequalis.
44. T. sabauda.
45. T. uniplicata.
46. Turbo tricolor.
47. T. purpureus.
48. Rissoa acicula.
49. R. elegans.
50. R. costulata.
51. R. pulchella.
52. R. tricolor.
52a. R. striolata.
53. Alvania lineata.
54. A. europea.
55. A. mediterranea.
56. A. dufresnei.
57. A. freminvillea.
58. A. costulosa.
59. A. nodulosa.
60. A. plicatula.
61. A. pyramidata.
62. A. sulzeriana.
63. Eulima glaberrima.
63a. Pyramidella carinata.
63b. Conus postdiluvianus.

1
3
4
5
6
7
10
8
12
13
14
15
16
2
9
7a
20a
11
17
20
18
9a
21
22
23
19
31
33
9b
34
35
20b
30
24
25
26
27
32
28
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
29
63a
46
47
52
55
56
57
53
52a
59
63
63b
54
58
62
48
49
50
51
60
61

(1944). 4 syntypes étiquetés *Planaxis variegatus* sont dans la collection Risso du Muséum : ils mesurent 23, 22, 21 et 20 mm. Je désigne le plus grand comme lectotype de *Purpurea variegata* Risso, 1826.

variegata, Trochus : cf. variegata, Gibbula.

variegatus, Planaxis : cf. variegata, Purpura.

variegatus, Turbo 1813 : 201. Puits Risso, à Grosueil, NW du Cap Ferrat.
= *Nomen nudum* (Non *Gibbula variegata* Risso, 1826). Selon Risso (1826), c'est son *Phorcus margaritaceus* Risso, 1826.

VEDIANTIUS 1826 : 81.
= *Ferrussacia* (sic) Risso, 1826, Ferrussaciidae.

velata, Ocythoe 1854 : 51, pl. 20 (le texte indique : pl. 24, fig. 1); Ms : pl. XXII (= Risso 1854, pl. 20). « Régions graveleuses ».
= *Tremoctopus violaceus* Delle Chiaje, 1830, Tremoctopodidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

(†) **ventricosa, Mitra** 1826 : 246 (n° 650); Ms : pl. 4 (ici : pl. 8, fig. 9). « Se trouve subfossile ».
= Mitridae. Matériel type présumé perdu.

[verrucosa, Alvania « Risso » 1826 : 144 (n° 362)].
= C'est le *Turbo verrucosus* Allan, 1818 : 463 (tiré à part : 38), pl. 10, fig. 12, annexé par Risso. 2 coquilles en collection Risso, mesurant chacune 5 mm = *Alvania cancellata* (Da Costa, 1778), Rissoidae.

vespertina, Patella 1826 : 262 (n° 697). « Sur les rochers peu profonds ».
= (Non *Patella vespertina* Reeve, 1855 = Acmaeidae) = ? *Patella ferruginea* Gm., 1791, Patellidae. Matériel type présumé perdu.

vilamillata (sic), Turbinella : cf. bilamillata, Turbinella.

villafranca, Doris 1818 : 370; 1826 : 32 (n° 79). « Sur l'ulva flabéliforme (*sic*) ».
= *Hypselodoris villafranca* (Risso, 1818), Chromodoridae. Ce nom a priorité sur celui de *Glossodoris gracilis* Rapp, 1827, auquel Pruvot-Fol (1954) et Haefelfinger (1969) l'ont assimilé. Matériel type présumé perdu.

violaceus, Octopus 1845 : 4 (*nomen nudum* à cette date); 1854 : 73, pl. 27 (le texte indique pl. 31, fig. 1); Ms : pl. XXIX (= Risso 1854, pl. 27). « Profondeurs rocailleuses et graveleuses ».
= (non *Tremoctopus violaceus* Delle Chiaje 1830) = *Ocythoe tuberculata* Raf., 1814, Ocythoidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

* * **violaceus, Trochus** 1826 : 127 (n° 307), pl. 8, fig. 111; Ms : pl. 35 (ici : pl. 9, fig. 118). « Régions coralligènes ».
= *Calliostoma conula* (L., 1766), Trochidae. Dans la collection Risso du Muséum, 1 coquille de 11 mm (dimension qu'indique la diagnose originale) que je désigne comme lectotype de *Trochus violaceus* Risso, 1826. Un autre tube de la collection Risso, étiqueté aussi *Trochus violaceus* contient 4 *Gibbula varia* (L., 1766) de 8 à 10 mm.

virescens, Doris 1826 : 31 (n° 74), pl. 2, fig. 11. « Sous les pierres du rivage ».

PLANCHE 9

Reproduction des illustrations inédites de P. Gény (MNHN Paris : Ms 2052, pl. 22, 24, 29-38) des mollusques de Risso.

64. Eione inflata.
65. E. donavania.
66. Cyclope neritoidea.
67. Eione sulcata.
68. E. pellucida.
69. Natica marmorata.
70. N. pulchella.
71. Nacca maxima.
72. N. fasciata.
73. Nanina unifasciata.
74. Neverita josephinia.
75. Buccinum biplicatum.
76. B. cancellatum.
77. B. allioni.
78. B. discors.
79. B. balbisianum.
80. B. elegantissimum.
81. B. tuberculatum.
82. B. angulatum.
83. B. uniplicatum.
84. B. costulosum.
85. B. proximum.
86. B. pulcherrimum.
87. B. affinis.
88. B. beccaria.
89. Purpura rafinesquia.
90. P. alba.
91. P. costulata.
92. P. lineolata.
93. P. glabra.
94. P. lamarchii.
95. P. corniculata.
96. P. variegata.
97. Planaxis imbricata.
98. P. tenuis.
99. P. lineolata.
100. P. rosacea.
101. P. desmarestiana.
102. P. turulosa.
103. P. loques.
104. P. olivacea.
105. P. affinis.
106. P. donatiana.
107. P. fitcheliana.
108. P. raricostata.
109. P. molliana.
110. P. discrepans.
111. P. riparia.
112. P. laevigata.
113. Simnia nicaeensis.
114. S. purpurea.
115. Cypraea mediterranea.
116. Volvaria sexplicata.
117. V. septemplicata.
118. Trochus violaceus.
119. T. bicolor.
120. T. lucidus.
121. T. dumerili.
122. T. reinierius.
123. T. tricolor.
124. T. lineolatus.
125. T. maculatus.
126. T. basteroti.
127. T. sowerbianus.
128. T. tuberosus.
129. Phorcus margaritaceus.
130. P. striatus.
131. Solarium carinatum.
132. S. denticulatum.
133. S. branderianum.


64
65
66
69
68
70
73
67
72
74
71
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
131
126
127
128
124
129
132
133
130

= *Dendrodoris limbata* (Cuvier, 1804), Dendrodoridae = *Doris nigricans* Otto, 1823, selon Risso (1826) lui-même : « J'ai décrit cette espèce sous le nom de *limbata* dans le journal de Physique ... » [= 1818 : 369]. Cette assimilation a été admise par tous les auteurs subséquents. Matériel type présumé perdu.

virescens, Eolidia 1826 : 38 (n° 91). « Régions des fucus ».
= Risso 1826 indique que son espèce est basée sur « Otto, Comp. Anim., IX, 11 », ce qui se traduit par Otto, 1821, Consp. Anim., p. 9, n° 11 et renvoit donc à *Eolidia ceratentona* Otto, 1821. Or cette espèce a été inscrite sous le n° 868 dans l'Official index of rejected and invalid specific names in Zoology (Opinion 774. *Bull. zool. Nomencl.*, 23, n° 2-3 : 88, 1966). Cette mesure n'atteint pas son synonyme junior (ICZN, article 16b). *E. virescens* Risso, 1826 qu'il serait bon d'inscrire à l'Official Index lui-aussi. Matériel type présumé perdu.

virescente, Aplysia 1826 [et non 1818 : cf. *unicolor, Aplysia*] : 42 (n° 96), pl. 1, fig. 10 (la légende indique : *Aplysia virescens,* sic). « Régions des fucus ».
= *Aplysia punctata* Cuvier, 1803, Aplysiidae (= *A. rosea* Rathke, 1799, invalidé 1955 : cf. *nigromarginata, Aplysia*). Matériel type présumé perdu.

* **viridescens, Leachia** 1826 : 102 (n° 238), pl. 3, fig. 35, sous *Leachia viridis.* « Fossés aquatiques ».
= Comme l'indiquait déjà Caziot (1919), il s'agit d'*Hydrobia acuta* (Drap., 1805), Hydrobiidae. La collection Risso du Muséum contient, sous le nom de *L. viridescens,* un syntype en mauvais état, de 4 mm (alors que Risso indique 6 mm dans sa diagnose) et un Pyramidellidae qui lui a été mêlé par erreur.

viridis, Leachia : cf. viridescens, Leachia.

vitrea, Crenea 1826 : 83 (n° 186). « Fossés humides ».
= *Caecilioïdes* (= *Caecilianella*) sp., juv., Ferrussaciidae, selon Bourguignat (1861). Matériel type présumé perdu.

vitrea, Cyclas 1826 : 338 (n° 914). « Fossés aquatiques ».
= *Pisidium casertanum* (Poli, 1792), Pisidiidae selon Bourguignat. Matériel type présumé perdu.

* * **vitrea, Leachia** 1826 : 103 (n° 240). « Dans les mares ».
= *Hydrobia* sp., Hydrobiidae. La collection Risso du Muséum contient 5 syntypes en mauvais état, mesurant de 2,5 à 2 mm. Je désigne l'un des syntypes de 2 mm (dimension indiquée par Risso dans sa diagnose) comme lectotype de *Leachia vitrea* Risso, 1826.

(†) **vitrea, Mactra** 1826 : 368 (n° 1012); Ms : pl. 84 (ici : pl. 12, fig. 226). « Se trouve subfossile ».
= ? *Spisula subtruncata* Da Costa, 1778, Mactridae, d'après diagnose et pl. Ms. 84. Matériel type présumé perdu.

vitrea, Mangelia 1826 : 222 (n° 584); Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 201). « Régions coralligènes ».
Matériel type présumé perdu.

(†) **vitreus, Capulus** 1826 : 254 (n° 673); Ms : pl. 5 (ici : pl. 8, fig. 13). « Subfossile à Grosueil ».
Matériel type présumé perdu.

[vitreus, Pecten « Risso » 1826 : 303, pl. 11; fig. 156 (n° 809); Ms : pl. 89].
= Il ne s'agit pas d'une espèce nouvelle de Risso, comme on l'a cru, mais de *Pallium vitreum* Chemn., 1782 qu'il a seulement changé de genre. Son nom actuel est *Propeamussium vitreum* (Chemn., 1817), Pectinidae. A

PLANCHE 10

Reproduction des illustrations inédites de P. Gény (MNHN Paris : Ms 2052, pl. 38 bis-40, 43-44, 46-48, 50-51, 56) des mollusques de Risso.

134. Gibbula bicolor.
135. G. sanguinea.
136. G. mediterranea.
137. G. tuberculata.
138. G. schroeterius.
139. G. rupestris.
140. G. variegata.
141. G. reticulata.
142. G. pygmaea.
143. G. morio.
144. G. discors.
145. Stomatia rugulosa.
146. Tricolia punctata.
147. T. rubra.
148. T. nicaeensis.
149. Murex bicolor.
150. M. squamulatus.
151. M. rudis.
152. M. costulatus.
153. M. ramulosus.
154. M. orbignianus.
155. M. boveus.
156. M. triquetra.
157. M. succinctus.
158. M. coronatus.
159. M. fortis.
160. M. mantelianus.
160a. M. fasciatus.
161. M. angulatus.
162. M. fistulatus.
163. Ranella pyramidata.
164. Murex pairodoa (*sic*).
165. M. daubuissonius.
166. Ranella gyrinata.
167. R. tuberculata.
168. R. lemania.
169. Dentalium deshayesi.
169a. D. spirale.
170. Fusus provencalis.
171. F. fragilis.
172. F. chloriteus.
173. F. audiberti.
174. F. longisipho.
175. F. martini.
176. Nesaea mamillata.
177. N. granulata.
178. Cancellaria proxima.
179. Murex asper.
180. Cancellaria muricata.
181. C. listeri.

Erratum : dans la planche elle-même, le numéro 169 (situé entre les figures 170 et 174) est à corriger en 165.

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
160a
161
162
163
164
166
167
169
169a
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

noter que dans la collection Risso, par suite d'un mélange, on trouve sous le nom de *Pecten vitreus* 3 spécimens de *Chlamys opercularis* mesurant 34 × 34 (1 valve, 32 × 33 (1 paire de valves) et 33 × ? (1 valve brisée) !

† **volutanus, Murex** 1826 : 198 (n° 512). « Fossile à Magnan » [Nice].
Matériel type présumé perdu.

(†) * * **vulgaris, Trochus** 1826 : 129 (n° 313). « Bords rocailleux (...). Se trouve subfossile ».
= *Jujubinus exasperatus* (Penn., 1777), Trochidae. La collection Risso du Muséum contient 3 syntypes de 11, 10 et 10 mm. Je désigne le plus grand (qui est peut être celui dont Risso indique la dimension : 12 mm) comme lectotype de *Trochus vulgaris* Risso, 1826.

† **werneriana, Pleurotoma** 1826 : 217 (n° 567), pl. 7, fig. 95; Ms : pl. 52 (ici : pl. 11, fig. 194). « Fossile à la Trinité ».
= Turridae. Matériel type présumé perdu.

zates, Argonauta 1845 : 4.
= *Nomen nudum,* Argonautidae.

zebrina, Sepia 1854 : 15, pl. 3-4 (le texte indique; pl. 5-6); Ms : pl. II-III (= Risso 1854, pl. 3-4). « Profondeurs vaseuses ».
= *Sepia officinalis* L., 1758, Sepiidae, selon Adam (1942). Matériel type présumé perdu.

[zonata, Mitra « Risso » 1826 : 244 (n° 644), pl. 6, fig. 73; Ms : pl. 4].
= C'est *Mitra zonata* Marryat, 1817, Mitridae, annexé par Risso !

zonatus, Trochus 1813 : 201. Provenance : Puits Risso, à Grosueil (NW du Cap Ferrat).
= *Nomen nudum.*

REFERENCES

ADAM, W. (1942). — Note sur les Céphalopodes. 21. A propos d'une publication peu connue d'A. Risso, 1854. *Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg.,* 18 (25) : 1-36.

ADAM, W., GLIBERT, M. (1974). — Contribution à la connaissance de *Nassarius semistriatus* (Brocchi, 1814) (Mollusca : Gastropoda). *Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg.,* (Biol.), 50 (3) : 1-78, pl. 1-5.

ALLAN, T. (1818). — Sketch of the geology of the environs of Nice. *Trans. roy. Soc. Edinb.,* 8 : 427-464, pl. 8-10.

BOURGUIGNAT, J.R. (1861). — Etude synonymique sur les Mollusques des Alpes-Maritimes publiés par A. Risso en 1826. Paris, Baillière 1-84, 1 portr., 1 pl.

BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P., DOLLFUS, G. (1882-1886). — Les Mollusques marins du Roussillon. Paris, Baillière, 1 : 1-570; Atlas, 1 : pl. 1-66.

CANTRAINE, F. (1840). — Malacologie méditerranéenne et littorale, ou description des mollusques qui vivent dans la Méditerranée ou sur le continent de l'Italie ainsi que des coquilles qui se trouvent dans les terrains tertiaires italiens... *Mém. Acad. roy. Brux.,* 13 : 1-173, pl. 1-6.

CARETTO, P.G. (1967). — Studio morfologico con l'aisilio del metodo statistico e nuova classificazione dei Gasteropodi Pliocenici attribuibili al *Murex brandaris* Linneo. *Mem. Soc. ital. Sci. nat., Mus. civ. Stor. nat. Milano,* 16 (1) : 1-60, pl. 1-10.

CATE, C.N. (1973). — A systematic revision of the recent Cypraeid family Ovulidae (Mollusca : Gastropoda). *Veliger,* 15, Suppl. : 1-116.

CAZIOT, E. (1919). — Synonymic study of the mollusks of the department des Alpes-Maritimes mentioned by Antoine Risso, with notes on their classification. *Proc. Acad. nat. Sci. Philad.,* 71 : 156-170.

CHAVAN, A. (1944). — Sur deux genres de Risso : *Protula, Lemintina. Bull. Mus. Hist. nat.,* (Ser. 2), 16 (5) : 331-338.

CHEVALLIER, H. (1976). — Types des espèces continentales de la collection Risso du Muséum national d'Histoire naturelle (Département de Malacologie). *Elona,* n° 3.

CHRISTIAENS, J. (1974 a). — Révision du genre *Patella* (Mollusca, Gastropoda). *Bull. Mus. Hist. nat.,* (Ser. 3) 182, Zool. 121, 1973 : 1305-1392.

CHRISTIAENS, J. (1974 b). — Les Fissurelles européennes. 3. Le genre *Diodora* Gray, 1821, *sensu* Iredale, 1915. Les *Diodora* européennes. *Inf. Soc. belge Malac.,* (ser. 3), n° 4 : 39-58.

PLANCHE 11

Reproduction des illustrations inédites de P. Gény (MNHN Paris : Ms 2052, pl. 52-55) des mollusques de Risso.

182. Cassidaria tuberculata.
183. C. scilla.
184. Cassis interrupta.
185. C. saussurea.
186. C. canaliculata.
187. C. gibba.
188. C. striolata.
189. C. sulcata.
190. Oniscia alicia.
191. Harpa raricostata.
192. Pleurotoma tricolor.
193. P. albida.
194. P. werneriana.
195. P. breislackia.
196. Mangelia clarissa.
197. Pleurotoma spinulosa.
198. P. consimilis.
199. P. bicolor.
200. P. affinis.
201. Mangelia vitrea.
201a. M. ginnania.
202. M. costulata.
203. M. undulata.
204. M. menardiana.
205. Turbonilla costulata.
206. T. humboldti.
207. Pyrula clathrata.
208. Anna massena.
209. Ancillaria fulminea.
210. Turbinella glabra.
211. Niso eburnea.
212. Lachesis mamillata.
213. Ostrea gryphoides.
214. O. eugenia.
215. O. puticulus.

Errata : dans la planche elle-même, 3 numéros sont à corriger : 200 (entre les fig. 189 et 190) = 201 a; 208 (entre les fig. 191 et 205) = 207; 211 (entre les fig. 191 et 192) = 210.

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
208
209
211
212
213
214
215

DALL, W.H. (1898). — On the genus *Halia* of Risso. *Proc. Acad. nat. Sci. Philad.*, 1898 : 190-192.

DESMAREST, A.G. (1814). — Description des coquilles univalves du genre *Rissoa* de M. de Fréminville. *Bull. Soc. Philom. Paris*, 1814 : 7-9, pl. 1.

EALES, N.B. (1960). — Revision of the world species of *Aplysia*. *Bull. brit. Mus. (Nat. Hist.)*, 5 (10) : 267-404.

FISCHER-PIETTE, E., BEIGBEDER, J. (1943). — Catalogue des types de Gastéropodes marins conservés au Laboratoire de Malacologie. 1-3 *Bull. Mus. Hist. nat.*, 15 (4) : 203-209; 15 (5) : 324-528; 15 (6) : 429-436.

FISCHER-PIETTE, E., BEIGBEDER, J. (1944). — Idem. 4-6. *Ibid.*, 16 (1) : 70-77; 16 (5) : 321-330; 16 (6) : 448-462.

GERMAIN, L. (1913). — Mollusques de la France et des régions voisines, vol. 2. Paris, Doin, Encycl. sci. : 1-374, pl. 1-23.

GIANNINI, F. (1975). — Conchiglie rare raccolte nel Tirreno (Nota seconda). *Conchiglie*, Milano, 11 (3-4) : 87-92, pl. 1-2.

HAEFELFINGER, H. (1969). — Zur Systematik der Glossodoridinae des Mittelmeeres. *Malacologia*, 9 (1) : 93-99.

LAMY, E. (1927). — Révision des Teredinidae vivants du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. *J. Conch.*, Paris, 70 (4), 1926 : 201-284.

LEACH, W.H. (1852). — Molluscorum Britanniae Synopsis. A synopsis of the Mollusca of Great Britain arranged according to their natural affinities and anatomical structure. London, J. van Voorst : I-XVI, 1-376.

LELOUP, E. (1939). — A propos de *Acanthochiton aeneus* (Risso, 1826). *Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg.*, 15 (25) : 1-2.

LELOUP, E. (1941). — A propos de quelques Acanthochitons peu connus ou nouveaux. 2. Région Atlantique. *Ibid.*, 17 (43); 1-15, pl. 1.

LOCARD, A. (1887). — Contributions à la faune malacologique française. 10. Monographie des espèces de la famille des Buccinidae. *Ann. Soc. linn. Lyon*, (N.S.) 33, 1886 : 17-127, 1 pl.

MONOD Th. (1931). — Inventaire des manuscrits de Risso conservés à la Bibliothèque du Muséum d'Histoire naturelle (Rissoana III). *Arch. Mus. Hist. nat.*, (Sér. 6) 7 : 101-133.

MONTEROSATO, T.A. di (1884). — Nomenclatura generica e specifica di alcune conchiglie mediterranee. Palermo : 1-152.

MONTEROSATO, T.A. di (1892). — Nota intorno ai *Pectunculus* dei mari d'Europa. *Naturalista siciliano*, 11 (6-8) : 143-155.

OTTO, A.W. (1821a). — Conspectus animalium quorundam maritimorum nondum editorum, pars prior. Vratislaviae, Typ. Universitatis : 1-20.

OTTO, A.W. (1821b). — Animalium maritimorum nondum editorum genera duo. *Nova Acta Acad. Leopold. nat. Cur.*, 10 : 619-634.

PAYRAUDEAU, B.C. (1826). — Catalogue descriptif et méthodique des Annélides et des Mollusques de l'île de Corse. Paris, Béchet : 1-218, pl. 1-8.

PETIT de LA SAUSSAYE, S. (1869). — Catalogue des Mollusques testacés des mers d'Europe. Paris, chez l'Auteur, rue Blanche, 25 : 1-314.

PRUVOT-FOL, A. (1936a). — Note préliminaire sur les Nudibranches de Risso. *Rev. suisse Zool.*, 43 (23) : 531-533.

PRUVOT-FOL, A. (1936b). — Essai d'identification des Nudibranches de Risso. *Ibid.*, 43 (29) : 631-639.

PRUVOT-FOL, A. (1951). — Etude des Nudibranches de la Méditerranée (2e partie). *Arch. Zool. exp. gén.*, 88 (1) : 1-80, pl. col. 1-4.

PRUVOT-FOL, A. (1954). — Mollusques Opisthobranches. *Faune de France*, Paris, Lechevalier : 1-460, pl. 1.

PLANCHE 12

Reproduction des illustrations inédites de P. Gény (MNHN Paris : Ms 2052, pl. 60, 68-69, 71, 73, 79-80, 82-85, 87, 89, XXXIX, XLI-XLII, XLVI, XLVIII, LII, LVII-LVIII, LX, LXVIII, LXX, XCI) des mollusques de Risso.

216. Gryphaea bisulcata.
217. G. sulcata.
218. Lima imbricata.
219. L. pentagona.
219a. L. levigata.
220. Modiolus costulatus.
221. M. sulcatus.
222. Arca reticulata.
223. A. argenvillea.
224. A. bonnaniana.
225. A. grenophia.
226. Mactra vitrea.
227. M. allania.
228. Lembulus rostratus.
229. L. rossianus.
229a. L. sulculatus.
230. Chama cavernosa.
231. Isocardium sulcatum.
232. Pinna perna.
233. Septaria mediterranea.
234. Gastrochena pelagica.
234a. Barnea spinosa.
235. Pecten pulcherrimus.
236. P. succineus.
237. P. incomparabilis (2 fig.).
237a. Ostrea curvata.
238. Venus fulva.
239. V. antiquata.
240. V. biradiata.
241. Tellina lineolata.
242. Arctoe nitidissima.
243. A. fulva.
244. A. lineolata.
245. A. parckinsonii.
246. Capsa rugosa.
247. Solen depressus.
248. Nautilus reinecki.
249. N. compressus.
250. N. montfortianus.
251. N. pygmaeus (2 fig.).
252. N. sulcatus.
253. N. bucklandius.
254. N. semilunaris.
255. Ammonites angustistriata.
256. A. rugulosa.
257. A. monnieriana.
258. A. oblonga.
259. A. sulcata.
260. A. flexuosa.
261. A. alpina.
262. A. antiqua.
263. Turrilites haania.

216
217
218
219
219a
241
226
228
225
229
224
227
221
229a
235
237a
220
222
231
223
236
230
238
232
237
234a
234
233
243
246
244
239
242
240
247
245
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

RANG, S. (1828). — Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles. Histoire naturelle des Aplysiens. Première famille de l'ordre des Tectibranches. Paris, F. Didot : 1-84, pl. col. 1-24.

RISSO, A. (1813). — Observations géologiques sur la presqu'île de Saint-Hospice, aux environs de Nice, département des Alpes-Maritimes. *J. Phys. Chimie Hist. nat.*, 77 : 197-209.

RISSO, A. (1818). — Mémoire sur quelques gastéropodes nouveaux, Nudibranches et Tectibranches observés dans la mer de Nice. *Ibid.*, 87 : 368-377.

RISSO, A. (1824). — Aperçu géologique sur les environs de Nice. *Nova Acta phys. med. Acad. Caes. Leopold. Car.*, 13 : 347-364.

RISSO, A. (1826). — Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et principalement de celles des environs de Nice et des Alpes-Maritimes. Mollusques, Paris, Levrault, 4 : I-VII, 1-439, pl. 1-12.

RISSO, A. (1831). — *Doris purpurea, Doris villafranca, in :* GUÉRIN, Magasin de conchyliologie ou description et figures de mollusques vivants et fossiles inédits ou non... *Mag. Zool.*, 1 (1) : 1-40, pl. 1-40.

RISSO, A. (1841). — Exposé des êtres organisés marins observés à Nice depuis la publication de l'*Histoire naturelle des principales productions du Midi. Atti Secunda Riunione Scienziati italiani*, Torino, 1840 : 239-240.

RISSO, A. (1845). — Catalogue des Céphalopodes observés à Nice par M. A. Risso, communiqué au V^e^ Congrès scientifique italien tenu à Lucques en 1843, suivi des observations de M. J.B. Vérany lues au Congrès scientifique de Milan en 1844. Gênes, Imprimerie des Sourds-Muets : 1-8.

RISSO, A. (1854). — Mollusques Céphalopodes vivants observés dans le parage méditerranéen du comté de Nice. Nice, Impr. Soc. typogr. : 1-82, pl. 1-33.

ROBSON, J.B. (1932). — A monograph of the Recent Cephalopoda. 2. Octopoda (excluding the Octopodinae). Brit. Mus., London : 1-359, 6 pl.

ROSSI-RONCHETTI, C. (1952). — I tipi della « Conchiologia fossile subappennina » di G. Brocchi. 1. Crostacei, Lamellibranchi. *Riv. ital. Paleont. Stratigr.*, Milano, Mém. 5 (1) : 1-89.

ROSSI-RONCHETTI, C. (1955). — Idem. 2. Gastropodi, Scafopodi. *Ibid.*, Mem. 5 (2) : 91-343.

SCACCHI, A. (1836). — Catalogo conchyliorum regni neapolitani. Neapoli, Sebetti : 1-18, 1 pl.

SCHILDER, F.A. (1932). — The living species of the Amphiperatinae. *Proc. malac. Soc. Lond.*, 20 (1) : 46-64, pl. 3-5.

SCHMEKEL, L. (1968). — Die Gattung *Doris* (Gastr. Nudibranchia) in Golf von Neapel. *Publ. Staz. zool. Napoli*, 36 (2) : 167-187.

SCHMEKEL, L. (1972). — Anatomie der Genitalorgane von Nudibranchiern (Gastropoda Euthyneura). *Pubbl. Staz. zool. Napoli*, 38 (1), 1970 : 120-217.

SMITH, A.G. (1960). — The type species of *Lepidopleurus* Leach in Risso, 1826. *Veliger*, 2 (4) : 75-77, pl. 17.

THIELE, J. (1931). — Handbuch der systematichen Weichtierkunde, 1. Jena, G. Fischer : 1-778.

VERANY, J.B. (1841). — Céphalopodes de la Méditerranée observés à Nice ou à Gênes par J.B. Vérany (...) et présentés à la 9^e^ séance du 2^e^ congrès scientifique italien tenu à Turin en septembre 1840. *Atti Secunda Riunione Scienziati italiani*, Torino 1840 : 235-236, 1 pl.

VÉRANY, J.B. (1845). — Voir Risso 1845.

VERANY, J.B. (1851). — Mollusques méditerranéens observés, décrits et figurés et chromolithographiés d'après le vivant. 1. Céphalopodes de la Méditerranée. Gênes, Impr. Sourds-Muets : I-XII, 1-132, 40 pl. col., 1 pl. n.

VÉRANY, J.B. (1853). — Catalogue des mollusques Céphalopodes, Ptéropodes, Gastéropodes Nudibranches, etc. des environs de Nice. *J. Conch.*, Paris, 4 : 375-392.

VOKES, H.E. (1967). — Genera of the Bivalvia : a systematic and bibliographic catalogue. *Bull. amer. Paleont.*, 51 (232) : 111-394.

Addendum : p. 108, colonne de droite, ajouter l'espèce suivante :

aurentiacus, Pleurobranchus 1818 : 374; 1826 : 40 (n° 93), pl. 1, fig. 8; Ms : 1 fig. dans « figures diverses ». « Endroits vaseux ».

= *Berthella aurantiaca* (Risso, 1818), Pleurobranchidae. Matériel type présumé perdu.